

Een traumatische biopsie vermijden bij een jong kind

Isabelle Tromme¹,
Pauline Richez²

1. Clinique du Mélanome,
Cliniques universitaires St-Luc, UCL, Brussel
2. Dienst Dermatologie, CHR Mons-Hainaut




We beschrijven het geval van een meisje van 4,5 jaar dat sinds 6 maanden een pigmentatie onder de linkerduimnagel vertoont.

De klinische beeldvorming (**Figuur 1**) en een dermatoscopie (**Figuur 2**) tonen een longitudinale, zwart-grijze pigmentatie bestaande uit onregelmatige stroken (onregelmatig qua dikte, spreiding en kleur).


Bij een volwassene zou dat zeer verontrustend zijn en doen denken aan een melanoom. Als zo'n letsel

voor de puberteit verschijnt, moet in de eerste plaats worden gedacht aan een naevus van het congenitale type. Het letsel opvolgen in plaats van een matrixbiopsie uit te voeren is een goede piste. Chirurgie doet immers pijn en laat een blijvend ontsierend of disfunctioneel matrixlitteken na. Vaak verdwijnen zulke letsels overigens vanzelf. Bij dit meisje was de regressie al vroeg te zien: een grijze kleur bij dermatoscopie correleert zeer vaak met regressie (zowel in de huid, als het slijmvlies of onder de nagel).


Figuur 1




Figuur 2



Figuur 3



Figuur 4



Figuur 5



Het meisje wordt om de 6 maanden teruggezien. Het letsel verdwijnt progressief en bijzonder snel (Figuur 3, 4 en 5).

De casus is opgenomen in het register van de IDS (*International Dermoscopy Society*) van congenitale naevi en naevi van het congenitale type van de nagelmatrix. De leeftijd van optreden is arbitrair vastgelegd op < 5 jaar (jonge leeftijd uit voorzorg in die eerste studie) voor het register. Pathologisch-anatomisch onderzoek van het letsel is niet vereist. Een eerste publicatie vat de kenmerken samen van 69 congenitale naevi en 161 naevi van het congenitale type van de nagelmatrix uit 30 landen verspreid over de hele wereld (waaronder enkele gevallen uit België) en vergelijkt de twee entiteiten.

Als volgende stap zouden we de evolutie van die letsels op middellange termijn moeten onderzoeken. ■

Zie ook het artikel daaromtrent dat verschenen is in SKIN 24/3 (juni-juli 2021):



Referenties

1. Dermatoscopic and clinical features of congenital or congenital-type nail matrix nevi: A multicenter prospective cohort study by the International Dermoscopy Society.
2. Pham F, Boespflug A, Duru G, Phan A, Poulalhon N, Weiler L, Tanaka M, Lallas A, Ogata D, Davaine AC, Bahadoran P, Balguerie X, Kaminska-Winciorek G, Tromme I, Correia O, Kim MB, Marghoob AA, Linda Martin, Guitera P, Meziane M, Miquel J, Mun JH, Argenziano G, Bessis D, Bourke J, Mijuskovic Z, Chiaverini C, Corven-Benoit C, Droitcourt C, Skowron F, Marque M, Zalaudek I, Rosendahl C, Moreno-Ramirez D, Vabres P, Haenssle H, Malvehy J, Puig S, Robert C, Schopf TR, Scope A, Dalle S, Thomas L. J Am Acad Dermatol. 2022 Sep;87(3):551-558. doi: 10.1016/j.jaad.2022.01.028. Epub 2022 Jan 29.PMID: 35104588