Chapitre III :
Du modèle conceptuel au modèle opérationnel

1. Le modèle conceptuel

2. Le modèle opérationnel

2.1. Les sources de données existantes

2.2. Les données utilisées dans le cadre de cette recherche

2.3. Opérationnalisation des concepts à l'aide des données des enquêtes Norbalt

Les concepts présents dans le modèle

Tableau 100.: Part de la variance expliquée par l'analyse factorielle en composantes principales, population masculine, Estonie 1994.

Composante	Valeurs propres initiales			Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus		
	Total	% de la variance	% cumulés	Total	% de la variance	% cumulés
1	3,331	47,585	47,585	3,331	47,585	47,585
2	,887	12,674	60,258			
3	,781	11,152	71,410			
4	,674	9,633	81,043			
5	,524	7,489	88,532			
6	,438	6,258	94,790			
7	,365	5,210	100,000			

Tableau 101 : Part de la variance expliquée par l'analyse factorielle en composantes principales, population féminine, Estonie 1994.

Composante	Valeurs propres initiales			Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus		
	Total	% de la variance	% cumulés	Total	% de la variance	% cumulés
1	3,434	49,050	49,050	3,434	49,050	49,050
2	,817	11,676	60,726			
3	,771	11,008	71,734			
4	,689	9,847	81,581			
5	,507	7,242	88,823			
6	,421	6,018	94,841			
7	,361	5,159	100,000			

Tableau 102 : Part de la variance expliquée par l'analyse factorielle en composantes principales, population masculine, Estonie 1999.

Composante	Valeurs propres initiales			Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus		
	Total	% de la variance	% cumulés	Total	% de la variance	% cumulés
1	3,604	51,481	51,481	3,604	51,481	51,481
2	,847	12,107	63,588			
3	,705	10,074	73,662			
4	,630	9,006	82,668			
5	,511	7,299	89,966			
6	,402	5,745	95,711			
7	,300	4,289	100,000			

Tableau 103 : Part de la variance expliquée par l'analyse factorielle en composantes principales, population féminine, Estonie 1999.

Composante	Valeurs propres initiales			Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus		
	Total	% de la variance	% cumulés	Total	% de la variance	% cumulés
1	3,263	46,615	46,615	3,263	46,615	46,615
2	,866	12,372	58,987			
3	,822	11,741	70,728			
4	,680	9,718	80,446			
5	,530	7,573	88,018			
6	,492	7,034	95,052			
7	,346	4,948	100,000			

Tableau 104 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population masculine, Estonie, 1994.

104A. Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,460	1,443	,481
2	-,120	,926	,309
3	-,878	,631	,210
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000*	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

104B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,604	,091	,305	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,629	,047	,324	,333
Your success in life depends on your family.	,209	,788	,002	,333
Total	1,443	,926	,631	1,000

Tableau 105 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population féminine, Estonie, 1994.

105A. Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,434	1,408	,469
2	-,124	,923	,308
3	-,743	,669	,223
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000(a)	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

105B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,594	,071	,335	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,592	,075	,334	,333
Your success in life depends on your family.	,222	,778	,000	,333
Total	1,408	,923	,669	1,000

Tableau 106 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population masculine, Lettonie, 1994.

106A. Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,394	1,357	,452
2	,004	1,003	,334
3	-,841	,641	,214
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000(a)	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

106B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,679	,002	,319	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,676	,007	,317	,333
Your success in life depends on your family.	,001	,994	,005	,333
Total	1,357	1,003	,641	1,000

Tableau 107 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population féminine, Lettonie, 1994.

107A. Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,376	1,334	,445
2	,012	1,008	,336
3	-,779	,658	,219
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000(a)	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

107B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,670	,006	,323	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,661	,019	,319	,333
Your success in life depends on your family.	,002	,982	,016	,333
Total	1,334	1,008	,658	1,000

Tableau 108 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population masculine, Lituanie, 1994.

108A. Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,377	1,336	,445
2	-,062	,960	,320
3	-,632	,704	,235
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000(a)	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

108B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,562	,113	,325	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,615	,020	,365	,333
Your success in life depends on your family.	,159	,827	,014	,333
Total	1,336	,960	,704	1,000

Tableau 109 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population féminine, Lituanie, 1994.

109A. Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,320	1,271	,424
2	-,025	,984	,328
3	-,512	,746	,249
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000(a)	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

109B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,598	,030	,372	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,600	,027	,374	,333
Your success in life depends on your family.	,073	,927	,000	,333
Total	1,271	,984	,746	1,000

Tableau 110 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population masculine, Estonie, 1999.

110A. Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,530	1,546	,515
2	-,313	,827	,276
3	-,895	,626	,209
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000(a)	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

110B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,594	,084	,322	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,581	,116	,303	,333
Your success in life depends on your family.	,372	,627	,001	,333
Total	1,546	,827	,626	1,000

Tableau 111 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population féminine, Estonie, 1999.

111A. Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,468	1,454	,485
2	-,222	,871	,290
3	-,722	,675	,225
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000(a)	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

111B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,561	,107	,331	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,570	,086	,343	,333
Your success in life depends on your family.	,322	,678	,000	,333
Total	1,454	,871	,675	1,000

Tableau 112 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population masculine, Lettonie, 1999.

112A. Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,362	1,318	,439
2	,005	1,004	,335
3	-,711	,678	,226
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000(a)	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

112B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,656	,010	,334	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,661	,003	,336	,333
Your success in life depends on your family.	,001	,991	,008	,333
Total	1,318	1,004	,678	1,000

Tableau 113 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population féminine, Lettonie, 1999.

113A. Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,345	1,299	,433
2	,021	1,014	,338
3	-,685	,687	,229
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000(a)	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

113B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,588	,112	,300	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,662	,003	,334	,333
Your success in life depends on your family.	,049	,899	,052	,333
Total	1,299	1,014	,687	1,000

Tableau 114 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population masculine, Lituanie, 1999.

114A. Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,446	1,423	,474
2	-,008	,995	,332
3	-1,075	,582	,194
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000(a)	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

114B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,698	,013	,289	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,705	,003	,292	,333
Your success in life depends on your family.	,020	,979	,001	,333
Total	1,423	,995	,582	1,000

Tableau 115 : Analyses des correspondances multiples des trois variables prises en compte par l'indicateur de locus de contrôle. Population féminine, Lituanie, 1999.

115A . Variance retenue par dimension

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance	
		Total (valeurs propres)	Inertie
1	,416	1,384	,461
2	-,008	,994	,331
3	-,912	,622	,207
Total		3,000	1,000
Moyenne	,000(a)	1,000	,333

* La moyenne des alpha de Cronbach est base sur la moyenne des valeurs propres.

115B. Mesures de discrimination

	Dimension			
	1	2	3	Moyenne
There is no point in planning future because nothing is ever a success.	,638	,072	,290	,333
Politics is so complex that it is difficult for people like me to understand what it is about.	,686	,001	,313	,333
Your success in life depends on your family.	,060	,921	,019	,333
Total	1,384	,994	,622	1,000

Tableau 116 : Coefficients de régression, population masculine et féminine tous âges, deux mesures différentes du locus de contrôle, Estonie 1994.

	Hommes		**Femmes**	
	3 variables	**Future + Politique**	**3 variables**	**Future + Politique**
Santé psychologique → Santé subjective	0,149	0,144	0,165	0,162
Instruction → **Locus de contrôle**	0,547*	0,427*	0,524	0,430
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,032	-0,068	-0,077	-0,111
Santé physique → Santé psychologique	0,281	0,278	0,245	0,243
Santé physique → Santé subjective	0,534	0,537	0,513	0,512
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,101	-0,124	-0,099	-0,138
Consommation d'alcool→ Santé subjective	-0,050	-0,048	-0,117	-0,119
Instruction → Consommation d'alcool	0,085	0,085	0,217	0,216
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,033	0,037	-0,032	-0,034
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,194	-0,195	-0,117	-0,119
Santé physique ↔ Instruction	-0,074	-0,074	-0,077	-0,078

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.

* indique des paramètres significativement différents au seuil de 0,05.

Tableau 117 : Distribution de la population masculine et féminine selon la quantité d'alcool consommée en moyenne en une occasion et la fréquence de consommation d'alcool au cours des deux dernières semaines. **Estonie, 1994**.

Estonie, Hommes, 1994				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**58.4^{ab}**	**40.1^{a}**	**42.4^{b}**
4 à 5 verres	0	22.5	**25.5^{a}**	**15.9^{a}**
6 verres ou plus	0	**19.1^{ab}**	**34.5^{a}**	**41.7^{b}**
	100 %	100 %	100 %	100 %
Estonie, Femmes, 1994				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**93.5^{ab}**	**76.7^{a}**	**67.1^{b}**
4 à 5 verres	0	**4.8^{a}**	**13.6^{a}**	10.6
6 verres ou plus	0	**1.7^{ab}**	**9.8^{a}**	**22.3^{b}**
	100 %	100 %	100 %	100 %

a, b, c indique des paramètres significativement différents deux à deux au seuil de 0,05.

Tableau 118 : Distribution de la population masculine et féminine selon la quantité d'alcool consommée en moyenne en une occasion et la fréquence de consommation d'alcool au cours des deux dernières semaines. **Lettonie, 1994**.

Lettonie, Hommes, 1994				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**53.0[a]**	**17.0a**	**25.2a**
4 à 5 verres	0	24.3	22.8	16.8
6 verres ou plus	0	**22.5[ab]**	**60.2[a]**	**58.0[b]**
	100 %	100 %	100 %	100 %
Lettonie, Femmes, 1994				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**85.5[a]**	**50.5[a]**	56.7
4 à 5 verres	0	**10.1[a]**	**27.7[a]**	15.1
6 verres ou plus	0	**4.4[ab]**	**20.4[a]**	**28.2[b]**
	100 %	100 %	100 %	100 %

a, b, c indique des paramètres significativement différents deux à deux au seuil de 0,05.

Tableau 119 : Distribution de la population masculine et féminine selon la quantité d'alcool consommée en moyenne en une occasion et la fréquence de consommation d'alcool au cours des deux dernières semaines. **Lituanie, 1994**.

Lituanie, Hommes, 1994				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**38.2[ab]**	**17.6[ac]**	**2.7[bc]**
4 à 5 verres	0	**26.2[a]**	**20.1[b]**	**8.2[ab]**
6 verres ou plus	0	**35.6[a]**	**61.8[b]**	**88.2[ab]**
	100 %	100 %	100 %	100 %
Lituanie, Femmes, 1994				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**82.3[ab]**	**44.2[ac]**	**10.8[bc]**
4 à 5 verres	0	**12.8[a]**	**27.1[a]**	19.9
6 verres ou plus	0	**4.9[ab]**	**28.6[ac]**	**69.2[bc]**
	100 %	100 %	100 %	100 %

a, b, c indique des paramètres significativement différents deux à deux au seuil de 0,05.

Tableau 120 : Distribution de la population masculine et féminine selon la quantité d'alcool consommée lors de la dernière occasion et la fréquence de consommation d'alcool au cours des deux dernières semaines. Estonie, 1999.

Estonie, Hommes, 1999.				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**65.8[a]**	**55.6[a]**	56.7
4 à 5 verres	0	16.1	18.9	18.5
6 verres ou plus	0	**18.1[a]**	**24.4[b]**	24.8
	100 %	100 %	100 %	100 %
Estonie, Femmes, 1999.				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**88.8 [a]**	84.1	**69.2 [a]**
4 à 5 verres	0	7.5	8.9	13.7
6 verres ou plus	0	**3.7 [a]**	6.9	**17.1 [a]**
	100 %	100 %	100 %	100 %

a, b, c indique des paramètres significativement différents deux à deux au seuil de 0,05.

Tableau 121 : Distribution de la population masculine et féminine selon la quantité d'alcool consommée lors de la dernière occasion et la fréquence de consommation d'alcool au cours des deux dernières semaines. Lettonie, 1999.

Lettonie, Hommes, 1999.				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**54.7[ab]**	**34.2 [a]**	**31.6[b]**
4 à 5 verres	0	23.9	23.3	12.6
6 verres ou plus	0	**21.4[ab]**	**42.5 [a]**	**55.8[b]**
	100 %	100 %	100 %	100 %
Lettonie, Femmes, 1999.				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**87.3[ab]**	**70.3 [a]**	**45.4[b]**
4 à 5 verres	0	10.9	18.7	29.6
6 verres ou plus	0	**1.8[ab]**	**11.0 [a]**	**25.0[b]**
	100 %	100 %	100 %	100 %

a, b, c indique des paramètres significativement différents deux à deux au seuil de 0,05.

Tableau 122 : Distribution de la population masculine et féminine selon la quantité d'alcool consommée lors de la dernière occasion et la fréquence de consommation d'alcool au cours des deux dernières semaines. Lituanie, 1999.

Lituanie, Hommes, 1999.				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**50.1^{ab}**	**29.2^{a}**	**11.6^{b}**
4 à 5 verres	0	**23.0^{a}**	18.8	**11.8 ^{a}**
6 verres ou plus	0	**26.9^{ab}**	**52.0^{ac}**	**76.6^{bc}**
	100 %	100 %	100 %	100 %
Lituanie, Femmes, 1999.				
	Abstèmes	**1 jour**	**2 à 3 jours**	**4 jours ou plus**
Abstèmes	100	0	0	0
1 à 3 verres	0	**82.5^{ab}**	**53.8 ^{a}**	**43.3 ^{b}**
4 à 5 verres	0	**12.0^{ab}**	**23.5 ^{a}**	**30.4^{b}**
6 verres ou plus	0	**5.5^{ab}**	**22.7^{a}**	**26.3^{b}**
	100 %	100 %	100 %	100 %


a, b, c indique des paramètres significativement différents deux à deux au seuil de 0,05.

Tableau 123 : Répartition de la consommation d'alcool moyenne en une occasion (1994) ou lors de la dernière occasion (1999) selon le type d'alcool.


	% de spiritueux	% de bière	% de vin	
1994				
Estonie, hommes	74%	15%	11%	100 %
Estonie, femmes	44%	6%	50%	100 %
Lettonie, hommes	74%	19%	7%	100 %
Lettonie, femmes	56%	5%	39%	100 %
Lituanie, hommes	68%	27%	5%	100 %
Lituanie, femmes	53%	10%	37%	100 %
1999				
Estonie, hommes	56%	33%	11%	100 %
Estonie, femmes	39%	9%	52%	100 %
Lettonie, hommes	74%	20%	6%	100 %
Lettonie, femmes	48%	6%	46%	100 %
Lituanie, hommes	47%	39%	14%	100 %
Lituanie, femmes	33%	15%	52%	100 %

Figure 100 : Distribution (%) de la population ayant consommé de l'alcool au cours des deux dernières semaines selon le type d'alcool consommé habituellement en une occasion (1994) au cours de la dernière occasion (1999).


Estonie, Hommes, 1994.




Estonie, Femmes, 1994.




Lettonie, Hommes, 1994.




Lettonie, Femmes, 1994.




Lituanie, Hommes, 1994.




Lituanie, Femmes, 1994.




Estonie, Hommes, 1999.




Estonie, Femmes, 1999.




Lettonie, Hommes, 1999.




Lettonie, Femmes, 1999.



Lituanie, Hommes, 1999.



Lituanie, Femmes, 1999.



Les concepts utilisés pour définir des sous populations spécifiques

Tableau 124 : Taille des populations totales et des populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin (effectifs non pondérés tels qu'utilisés par Amos) et entre parenthèses proportions de ces sous-populations par rapport aux populations totales, 1999.

	Estonie		**Lettonie**		**Lituanie**	
	Hommes	**Femmes**	**Hommes**	**Femmes**	**Hommes**	**Femmes**
Population totale	1859	2867	1196	1848	1146	1597
Population ayant besoins des deux soins médicaux	610 (32,8 %)	1038 (36,2 %)	363 (30,3 %)	733 (39,7%)	352 (30,7 %)	570 (35,7 %)

Tableau 125 : Distribution de la population estonienne selon la citoyenneté et l'ethnie, 31 Mars 2000.

Citoyenneté	***Ethnie***				
	Estonien	**Russe**	**Autre ethnie**	**Ethnie inconnue**	**Total**
Estonie	**922135**[1] *84,17*[2] 99,13[3]	**141848** *12,95* 40,39	**29719** *2,71* 36,81	**1855** *0,17* 23,42	**1095557** *100* 79,96
Russie	**692** 0.80 *0.07*	**73375** 85.26 *20.89*	**11577** 13.45 *14.34*	**415** 0.48 *5.24*	**86059** 100 *6.28*
Autres	**234** 2.56 *0.03*	**1111** 12.16 *0.32*	**7619** 83.40 *9.44*	**171** 1.87 *2.16*	**9135** 100 *0.67*
Sans ou inconnue	**7158** *3,99* 0,77	**134844** *75,21* 38,40	**31821** *17,75* 39,41	**5478** *3,06* 69,18	**179301** *100* 13,09
Total	**930219** *67,90* 100	**351178** *25,63* 100	**80736** *5,89* 100	**7919** *0,58* 100	**1370052** *1* 100

[1] Effectifs.
[2] Pourcentages en ligne.
[3] Pourcentages en colonne.
Source : Recensement de la population, Statistical office of Estonia, 2007.

Tableau 126 : Effectifs des données manquantes et pourcentage par rapport à la population totale selon les différents indicateurs. Estonie.

	1994				**1999**			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Santé subjective	17	0.8	6	0.3	4	0.2	4	0.2
Santé psychologique	15	0.7	6	0.3	37	1.9	44	1.9
Consommation d'alcool	91	4.3	161	7.0	39	2.0	47	2.0
Santé physique	15	0.7	6	0.3	101	5.2	179	7.6
Locus de contrôle	223	10.4	226	9.8	420	21.7	567	24.2
Niveau d'instruction	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Soutien social					72	3.7	71	3.0

Tableau 127 : Effectifs des données manquantes et pourcentage par rapport à la population totale selon les différents indicateurs. Lettonie.

	1994				**1999**			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Santé subjective	16	1.3	17	0.9	0	0.0	2	0.1
Santé psychologique	16	1.3	17	0.9	13	1.0	21	1.3
Consommation d'alcool	29	2.2	51	2.8	10	0.8	6	0.4
Santé physique	16	1.3	17	0.9	26	2.0	32	2.1
Locus de contrôle	300	23.4	502	27.2	118	9.3	167	10.8
Niveau d'instruction	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Soutien social					25	2.0	20	1.3

Tableau 128 : Effectifs des données manquantes et pourcentage par rapport à la population totale selon les différents indicateurs. Lituanie.

	1994				**1999**			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Santé subjective	32	3.0	20	1.5	3	0.3	7	0.5
Santé psychologique	36	3.3	25	1.9	77	6.2	127	8.5
Santé physique	91	8.5	97	7.2	158	12.6	165	11.1
Consommation d'alcool	34	3.2	24	1.8	123	9.8	227	15.2
Locus de contrôle	188	17.7	205	15.2	262	20.8	312	21.0
Niveau d'instruction	0	0.0	0	0.0	5	0.4	3	0.2
Soutien social					93	7.4	86	5.8

Tableau 129 : Distribution des données manquantes du locus de contrôle selon le niveau d'instruction

	Primaire ou inférieur	**Secondaire**	**Supérieur**
1994			
Estonie Hommes	12.7	9.4	9.1
Estonie Femmes	13.5[ab]	8.4[a]	8.0[b]
Lettonie Hommes	27.5[a]	21.1[a]	22.0
Lettonie Femmes	32.5[ab]	24.7[a]	23.2[b]
Lituanie Hommes	23.7[ab]	16.3[a]	8.9[b]
Lituanie Femmes	24.0[ab]	10.6[a]	10.6[b]
1999			
Estonie Hommes	24.0	22.2	18.6
Estonie Femmes	29.2[ab]	22.7[a]	22.0[b]
Lettonie Hommes	9.8	8.8	9.6
Lettonie Femmes	13.7	9.4	9.6
Lituanie Hommes	22.8	20.3	19.6
Lituanie Femmes	26.9[ab]	15.8[a]	20.0[b]

a, b La différences entre les proportions est statistiquement significative au seuil de 0.05.

Tableau 130 : Distribution des données manquantes du locus de contrôle selon l'état de santé subjective

	Bon	**Moyen**	**Mauvais**
1994			
Estonie Hommes	9.8	9.5	10.3
Estonie Femmes	7.5[a]	9.8	11.7[a]
Lettonie Hommes	19.6	24.0	23.3
Lettonie Femmes	21.7[a]	24.6[b]	32.6[ab]
Lituanie Hommes	14.0[a]	13.6[b]	23.0[ab]
Lituanie Femmes	10.3[a]	12.3[b]	21.1[ab]
1999			
Estonie Hommes	21.7	20.8	25.4
Estonie Femmes	22.7[a]	23.1[b]	29.1[ab]
Lettonie Hommes	7.6	9.7	11.3
Lettonie Femmes	7.9[a]	9.9[b]	14.4[ab]
Lituanie Hommes	22.1	18.4	25.5
Lituanie Femmes	15.1[ab]	22.2[a]	24.7[b]

a, b La différences entre les proportions est statistiquement significative au seuil de 0.05.

Tableau 131 : Distribution des données manquantes du locus de contrôle selon l'état de santé psychologique

	Bon	Moyen	Mauvais
1994			
Estonie Hommes	10.9	9.0	9.5
Estonie Femmes	10.2	9.8	8.9
Lettonie Hommes	22.6	22.9	20.9
Lettonie Femmes	25.4	26.7	26.9
Lituanie Hommes	15.3	14.1	16.5
Lituanie Femmes	12.7	12.5	17.1
1999			
Estonie Hommes	22.6	19.0	21.1
Estonie Femmes	24.6	22.2	24.7
Lettonie Hommes	9.2	8.5	10.4
Lettonie Femmes	6.8[a]	12.6[a]	11.0
Lituanie Hommes	20.4	19.0	21.8
Lituanie Femmes	19.6	19.5	19.6

a, b La différences entre les proportions est statistiquement significative au seuil de 0.05.

Tableau 132 : Distribution des données manquantes du locus de contrôle selon l'état de santé physique

	Bon	Moyen	Mauvais
1994			
Estonie Hommes	9.4	10.6	9.2
Estonie Femmes	8.8	10.2	10.2
Lettonie Hommes	20.7	24.9	27.9
Lettonie Femmes	26.4	26.5	26.8
Lituanie Hommes	15.1	11.7	19.9
Lituanie Femmes	13.2[a]	9.5[b]	21.9[ab]
1999			
Estonie Hommes	20.7	24.1	22.3
Estonie Femmes	24.7	21.8	21.9
Lettonie Hommes	9.1	6.2	13.7
Lettonie Femmes	9.5 [a]	10.7	17.9 [a]
Lituanie Hommes	20.8 [a]	15.2 [b]	36.6 [ab]
Lituanie Femmes	20.2	14.5	23.4

a, b La différences entre les proportions est statistiquement significative au seuil de 0.05.

Tableau 133 : Distribution des données manquantes du locus de contrôle selon la consommation d'alcool

	Abstème	1 jour	2 ou 3 jours	4 jours ou plus
1994				
Estonie Hommes	10.2	8.1	10.4	8.7
Estonie Femmes	9.1	7.5	9.4	14.7
Lettonie Hommes	22.4	19.9	26.3	31.0
Lettonie Femmes	28.5	23.3	15.2	27.6
Lituanie Hommes	14.7	14.8	13.8	11.8
Lituanie Femmes	16.5	12.3	9.1	3.3
1999				
Estonie Hommes	22.8	19.2	20.6	24.0
Estonie Femmes	25.4	22.1	22.2	19.3
Lettonie Hommes	11.4	7.6	7.5	8.1
Lettonie Femmes	11.9	8.8	9.1	6.1
Lituanie Hommes	22.6	16.2	20.5	15.2
Lituanie Femmes	21.1	14.6 [a]	22.1	36.1 [a]

[a, b] La différences entre les proportions est statistique36.1ment significative au seuil de 0.05.

Tableau 134 : Distribution des données manquantes du soutien social

	Très satisfait	Satisfait	Insatisfait	Très insatisfait
1999				
Estonie Hommes	21.7	14.4	24.1	16.9
Estonie Femmes	23.9	20.7	21.3	26.2
Lettonie Hommes	8.0 [a]	17.0 [a]	18.6	10.1
Lettonie Femmes	10.8	9.3	5.0	7.8
Lituanie Hommes	18.6	22.7	22.2	19.5
Lituanie Femmes	19.4	21.7	19.6	26.2

[a, b] La différences entre les proportions est statistiquement significative au seuil de 0.05.

Tableau 135 : Distribution des données manquantes du locus de contrôle selon le groupe d'âge

	18-29 ans	30-44 ans	45-59 ans	60 ans et plus
1994				
Estonie Hommes	11.6	10.6	9.7	10.1
Estonie Femmes	7.3	9.6 [a]	8.8	12.7 [a]
Lettonie Hommes	27.7 [a]	25.3	18.0 [a]	23.6
Lettonie Femmes	23.0 [a]	24.0 [b]	21.6 [c]	35.9 [abc]
Lituanie Hommes	19.1	17.3	12.1 [a]	22.5 [a]
Lituanie Femmes	11.4 [a]	12.7 [b]	11.2 [c]	24.2 [abc]
1999				
Estonie Hommes	23.8	20.2	19.1	24.5
Estonie Femmes	22.4	23.0	22.4	27.6
Lettonie Hommes	8.1	8.5	10.7	10.5
Lettonie Femmes	6.1 [a]	9.7	9.6	15.3 [a]
Lituanie Hommes	22.6	20.3	16.8	23.9
Lituanie Femmes	21.5	18.3 [a]	16.3 [b]	26.7 [ab]

[a, b] La différences entre les proportions est statistiquement significative au seuil de 0.05.

2.4. Opérationnalisation des concepts à l'aide des données de l'enquête EHIS

Tableau 136 : Analyse factorielle en composantes principales sur l'ensemble de la population, 1996.

Composante	Valeurs propres initiales			Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus		
	Total	% de la variance	% cumulés	Total	% de la variance	% cumulés
1	11,255	48,936	48,936	11,255	48,936	48,936
2	1,371	5,961	54,898	1,371	5,961	54,898
3	,957	4,160	59,058			
4	,851	3,701	62,759			
5	,798	3,468	66,226			
6	,673	2,927	69,153			
7	,584	2,540	71,693			
8	,567	2,466	74,159			
9	,543	2,360	76,519			
10	,518	2,254	78,772			
11	,479	2,082	80,855			
12	,459	1,996	82,850			
13	,450	1,956	84,806			
14	,429	1,865	86,672			
15	,409	1,780	88,452			
16	,394	1,714	90,166			
17	,386	1,677	91,842			
18	,363	1,577	93,420			
19	,350	1,523	94,943			
20	,331	1,438	96,381			
21	,303	1,318	97,698			
22	,291	1,266	98,965			
23	,238	1,035	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tableau 137 : Corrélations entre la consommation totale d'alcool et la consommation en une occasion au cours des quatre dernière semaines

			Consommation d'alcool en une occasion au cours des 4 dernières semaines	Consommation totale d'alcool au cours des 4 dernières semaines
Hommes	Consommation d'alcool en une occasion au cours des 4 dernières semaines	Pearson Correlation	1	,476(**)
		Sig. (2-tailed)		,000
		N	1255	1255
	Consommation totale d'alcool au cours des 4 dernières semaines	Pearson Correlation	,476(**)	1
		Sig. (2-tailed)	,000	
		N	1255	1255
Femmes	Consommation d'alcool en une occasion au cours des 4 dernières semaines	Pearson Correlation	1	,504(**)
		Sig. (2-tailed)		,000
		N	896	896
	Consommation totale d'alcool au cours des 4 dernières semaines	Pearson Correlation	,504(**)	1
		Sig. (2-tailed)	,000	
		N	896	898

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Chapitre IV :

La santé subjective et ses “parents”

1. La santé subjective

1.1. Les taux de prévalence au sein de la population totale

1.1.1. Evolutions temporelles

1.1.2. Différences selon le sexe

1.1.3. Différences entre pays

1.1.4. Différences ethniques

Tableau 138 : Distribution de la population selon l’état de santé subjective et selon l’ethnie, Estonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniens**	**Non-Estoniens**
Bonne	41,3	31,0	36,6	17,8
Moyenne	42,2	54,2	43,5	56,2
Mauvaise	16,5	14,8	19,9	26,0
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 139 : Distribution de la population selon l’état de santé subjective et selon l’ethnie, Lettonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Bonne	35,3	32,1	22,0	14,0
Moyenne	47,1	50,3	48,3	55,0
Mauvaise	17,7	17,7	29,7	31,0
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 140 : Distribution de la population selon l’état de santé subjective et selon l’ethnie, Lituanie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Bonne	41,9	32,3	24,1	19,7
Moyenne	43,5	52,1	51,7	55,4
Mauvaise	14,7	15,6	24,2	24,9
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 141 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective et selon l'ethnie, Estonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniens**	**Non-Estoniens**
Bonne	36,8	37,1	34,4	20,0
Moyenne	49,6	50,0	48,6	57,4
Mauvaise	13,6	12,9	17,0	22,6
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 142 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective et selon l'ethnie, Lettonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Bonne	34,3	30,0	24,3	18,3
Moyenne	47,9	51,5	47,8	48,5
Mauvaise	17,8	18,5	27,9	33,1
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 143 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective et selon l'ethnie, Lituanie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Bonne	44,0	39,4	27,2	20,5
Moyenne	45,5	48,2	53,9	57,2
Mauvaise	10,5	12,4	18,9	22,3
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

1.1.5. Différences économiques

Tableau 144A : Distribution de la population selon la santé subjective, le sexe, l'année et le groupe économique. **Estonie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Bonne	33.1	35.2	51.3	26.8	32.1	44.0	24.7	30.0	40.1	20.9	24.0	39.2
Moyenne	45.3	48.2	42.3	43.7	53.0	49.1	44.9	49.5	45.2	43.9	53.9	52.4
Mauvaise	21.6	16.6	6.4	29.5	14.8	6.9	30.4	20.5	14.8	35.1	22.1	8.5
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 144B : Comparaison des proportions, santé subjective.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Bonne			FM			FM			FM			FM
Moyenne					F						F	F
Mauvaise	ME	E		ME	E		ME			ME	E	

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 145A : Distribution de la population selon la santé subjective, le sexe, l'année et le groupe économique. **Lettonie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Bonne	28.7	32.6	49.0	29.7	26.2	40.8	15.0	18.6	26.8	16.5	16.5	33.9
Moyenne	45.0	51.4	42.3	44.3	51.6	50.2	42.8	54.3	58.5	44.2	48.1	51.5
Mauvaise	26.2	16.0	8.7	26.0	22.2	9.0	42.2	27.2	14.7	39.3	35.5	14.5
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 145B : Comparaison des proportions, santé subjective.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Bonne			FM			FM			FM			FM
Moyenne												
Mauvaise	ME	E		E	E		E	E		E	E	

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 146A : Distribution de la population selon la santé subjective, le sexe, l'année et le groupe économique. **Lituanie**

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Bonne	40.4	35.9	51.3	36.1	34.7	51.7	21.3	23.3	31.3	17.5	20.8	36.4
Moyenne	32.6	50.6	42.9	45.7	51.8	42.6	44.8	52.5	57.6	51.8	57.8	52.6
Mauvaise	27.0	13.5	5.8	18.1	13.5	5.7	33.9	24.3	11.0	30.7	21.5	11.1
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 146B : Comparaison des proportions, santé subjective.

	Hommes						**Femmes**					
	1994			**1999**			**1994**			**1999**		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Bonne			M			FM			M			FM
Moyenne		F			E							
Mauvaise	ME	E		E	E		E	E		ME	E	

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

1.2. Population par groupes d'âges

Tableau 147A : Distribution de la population masculine selon la santé subjective, le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus
Bonne	65.1	42.6	24.9	8.5	55.4	41.2	18.6	8.0	71.0	49.4	31.0	12.1
Moyenne	30.8	49.9	61.7	58.5	40.4	48.3	59.2	50.5	26.3	46.1	57.2	57.8
Mauvaise	4.0	7.4	13.4	33.0	4.2	10.5	22.2	41.5	2.7	4.5	11.8	30.0
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 147B : Comparaison des proportions selon l'état de santé subjective et le groupe d'âge, population masculine, 1999.

	Estonie				**Lettonie**				**Lituanie**			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Bonne	BCD	CD	D		BCD	CD	D		BCD	CD	D	
Moyenne		A	AB	AB			AB			A	AB	AB
Mauvaise			AB	ABC		A	AB	ABC			AB	ABC
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 148A : Distribution de la population féminine selon la santé subjective, le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				**Lettonie**				**Lituanie**			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Bonne	61.2	38.8	21.6	7.4	47.7	27.6	13.6	6.6	58.3	32.2	16.5	5.0
Moyenne	35.3	53.9	61.6	51.8	44.4	59.1	56.0	35.8	37.7	62.9	64.0	51.0
Mauvaise	3.5	7.3	16.8	40.8	7.9	13.3	30.4	57.6	4.4	4.9	19.5	44.0
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 148B : Comparaison des proportions selon l'état de santé subjective et le groupe d'âge, population féminine, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Bonne	BCD	CD	D		BCD	CD	D		BCD	CD	D	
Moyenne		A	ABD	A		AD	AD			AD	AD	A
Mauvaise		A	AB	ABC			AB	ABC			AB	ABC
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Caractéristiques générales des modèles

2.1. Choisir une distribution a priori informative ou non informative ?

2.2. Excellente qualité d'ajustement des modèles

Tableau 149 : Ajustement du modèle, populations masculines (Posterior predictive p-values).

	Estonie		Lettonie		Lituanie	
	1994	**1999**	**1994**	**1999**	**1994**	**1999**
Tous âges	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50
18-29 ans	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50
30-44 ans	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49
45-59 ans	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50	0,50
60 ans et +	0,50	0,49	0,51	0,50	0,51	0,50
Ethnie du pays de résidence	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50
Autres ethnies	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51
Niveau économique faible	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,50
Niveau économique moyen	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49
Niveau économique élevé	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,49

Tableau 150 : Ajustement du modèle, populations féminines (Posterior predictive p-values).

	Estonie		Lettonie		Lituanie	
	1994	**1999**	**1994**	**1999**	**1994**	**1999**
Tous âges	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49
18-29 ans	0,49	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50
30-44 ans	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
45-59 ans	0,51	0,49	0,51	0,50	0,50	0,49
60 ans et +	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Ethnie du pays de résidence	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Autres ethnies	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Niveau économique faible	0,50	0,51	0,50	0,51	0,50	0,50
Niveau économique moyen	0,50	0,50	0,49	0,51	0,51	0,50
Niveau économique élevé	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50

3. Les "parents" de la santé subjective : taux de prévalences et influences directes et indirectes

Tableau 151 : Coefficients de régression, Estonie, Lettonie et Lituanie, 1994, populations masculine et féminine.

	Estonie		**Lettonie**		**Lituanie**	
	Hom.	**Fem.**	**Hom.**	**Fem.**	**Hom.**	**Fem.**
Santé psychologique → Santé subjective	0,149	0,165	0,203	0,217	0,186	0,231
Instruction → Locus de contrôle	0,547	0,524	0,383	0,331	0,419	0,384
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,032	-0,077	-0,055	-0,080	-0,082	-0,069
Santé physique → Santé psychologique	0,281	0,245	0,265	0,264	0,367	0,310
Santé physique → Santé subjective	0,534	0,513	0,436 *	0,344*	0,415	0,335
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,101	-0,099	-0,093	-0,106	-0,117	-0,150
Consommation d'alcool → Santé subjective	-0,050 *	-0,117 *	-0,052 *	-0,173 *	-0,065*	-0,163*
Instruction → Consommation d'alcool	0,085 *	0,217 *	0,030 *	0,187 *	0,113	0,258
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,033	-0,032	-0,015	0,019	-0,033	-0,080
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,194	-0,117	-0,176	-0,139	-0,227	-0,098
Santé physique ↔ Instruction	-0,074	-0,077	-0,086	-0,109	-0,093	-0,110

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre les deux sexes dans le même pays au seuil de 0,05.

Tableau 152 : Coefficients de régression, Estonie, Lettonie et Lituanie, 1999, populations masculine et féminine.

	Estonie		**Lettonie**		**Lituanie**	
	Hom.	**Fem.**	**Hom.**	**Fem.**	**Hom.**	**Fem.**
Santé psychologique → Santé subjective	0,156	0,159	0,192	0,217	0,222	0,231
Instruction → Locus de contrôle	0,520	0,456	0,377	0,304	0,329	0,299
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,027	-0,083	-0,056	-0,080	-0,072	-0,077
Santé physique → Santé psychologique	0,308*	0,245*	0,311	0,274	0,356	0,296
Santé physique → Santé subjective	0,524	0,495	0,455*	0,355*	0,499*	0,386*
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,102	-0,109	-0,105	-0,095	-0,091	-0,118
Consommation d'alcool → Santé subjective	-0,039*	-0,094*	-0,054*	-0,181*	-0,068*	-0,157*
Instruction → Consommation d'alcool	0,087*	0,201*	0,050*	0,162*	0,127	0,193
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,054*	-0,014*	-0,013	0,008	-0,018	**-0,030**
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,186	-0,127	-0,164	-0,141	-0,215*	-0,087*
Soutien social →Santé psychologique	0,029	0,035	-0,008*	0,172 *	0,016	0,091
Santé physique ↔ Instruction	-0,057*	-0,102*	-0,076	-0,102	-0,070	-0,086
Santé physique ↔ Soutien social	0,020	0,037	**0,018**	0,051	0,028	0,031
Soutien social ↔ Instruction	0,002*	-0,049*	**-0,024**	-0,045	**-0,023**	-0,039

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre les deux sexes dans le même pays au seuil de 0,05.

Tableau 153 : Coefficients de régression, population masculine estonienne selon l'ethnie et l'année.

	1994		1999	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniens**	**Non-Estoniens**
Santé psychologique → Santé subjective	0,145	0,142	0,155	0,198
Instruction → Locus de contrôle	0,639*	0,391*	0,574	0,393
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,004	**-0,053**	-0,008	-0,034
Santé physique → Santé psychologique	0,306	0,261	0,327	0,376
Santé physique → Santé subjective	0,583*	0,457*	0,516	0,481
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,088	-0,109	-0,117	-0,076
Consommation d'alcool→ Santé subjective	-0,051	-0,031	-0,019	-0,052
Instruction → Consommation d'alcool	0,120	0,042	0,111	0,083
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,051	0,054	0,126	-0,003
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,195	-0,222	-0,174	-0,209
Soutien social →Santé psychologique			0,018	0,043
Santé physique ↔ Instruction	-0,085	-0,049	-0,070	-0,026
Santé physique ↔ Soutien social			0,034	-0,006
Soutien social ↔ Instruction			0,004	-0,001

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
Les astérisques signifient que les paramètres sont statistiquement différents au sein de l'année considérée au seuil de 0,05.

Tableau 154 : Coefficients de régression, population masculine lettone selon l'ethnie et l'année.

	1994		1999	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Santé psychologique → Santé subjective	0,224	0,179	0,162	0,190
Instruction → Locus de contrôle	0,451	0,305	0,419	0,330
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,081	-0,028	-0,045	-0,060
Santé physique → Santé psychologique	0,253	0,289	0,352	0,374
Santé physique → Santé subjective	0,458	0,406	0,470	0,491
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,109	-0,050	-0,134	-0,079
Consommation d'alcool→ Santé subjective	-0,021	-0,094	-0,056	-0,047
Instruction → Consommation d'alcool	0,012	0,058	0,140	-0,021
Santé psychologique → Consommation d'alcool	-0,027	-0,002	-0,021	-0,006
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,163	-0,211	-0,128	-0,161
Soutien social →Santé psychologique			0,015	-0,038
Santé physique ↔ Instruction	-0,067	-0,111	-0,077	-0,071
Santé physique ↔ Soutien social			0,026	0,010
Soutien social ↔ Instruction			-0,013	-0,045

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
Les astérisques signifient que les paramètres sont statistiquement différents au sein de l'année considérée au seuil de 0,05.

Tableau 155 : Coefficients de régression, population masculine lituanienne selon l'ethnie et l'année.

	1994		1999	
	Lituaniens	Non-Lituaniens	Lituaniens	Non-Lituaniens
Santé psychologique → Santé subjective	0,198	0,126	0,232	0,256
Instruction → Locus de contrôle	0,434	0,330	0,301	0,084
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,073	**-0,119**	-0,056	-0,136
Santé physique → Santé psychologique	0,367	0,372	0,309	0,483
Santé physique → Santé subjective	0,415	0,419	0,609	0,581
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,128	-0,067	-0,074	0,049
Consommation d'alcool→ Santé subjective	-0,064	-0,076	-0,056	**-0,089**
Instruction → Consommation d'alcool	0,121	0,080	0,155	0,069
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,007	-0,205	-0,016	0,043
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,225	-0,245	-0,180	-0,351
Soutien social →Santé psychologique			0,027	-0,013
Santé physique ↔ Instruction	-0,091	-0,108	-0,079	-0,035
Santé physique ↔ Soutien social			0,023	0,057
Soutien social ↔ Instruction			-0,035	0,036

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
Les astérisques signifient que les paramètres sont statistiquement différents au sein de l'année considérée au seuil de 0,05.

Tableau 156 : Coefficients de régression, population féminine estonienne selon l'ethnie et l'année.

	1994		1999	
	Estoniennes	Non-Estoniennes	Estoniennes	Non-Estoniennes
Santé psychologique → Santé subjective	0,144	0,169	0,141	0,185
Instruction → Locus de contrôle	0,615*	0,386*	0,481*	0,291*
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,050	-0,102	-0,094	-0,081
Santé physique → Santé psychologique	0,263	0,214	0,260	0,210
Santé physique → Santé subjective	0,570*	0,426*	0,487	0,471
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,084	-0,096	-0,134	-0,061
Consommation d'alcool→ Santé subjective	-0,121	-0,096	-0,091	**-0,038**
Instruction → Consommation d'alcool	0,235	0,189	0,218	0,142
Santé psychologique → Consommation d'alcool	-0,011	-0,050	0,002	0,017
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,125	-0,105	-0,134	-0,152
Soutien social →Santé psychologique			0,020	0,062
Santé physique ↔ Instruction	-0,076	-0,081	-0,108	-0,094
Santé physique ↔ Soutien social			0,041	0,033
Soutien social ↔ Instruction			-0,043	-0,060

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
Les astérisques signifient que les paramètres sont statistiquement différents au sein de l'année considérée au seuil de 0,05.

Tableau 157 : Coefficients de régression, population féminine lettone selon l'ethnie et l'année.

	1994		1999	
	Lettones	**Non-Lettones**	**Lettones**	**Non-Lettones**
Santé psychologique → Santé subjective	0,210	0,217	0,191	0,249
Instruction → Locus de contrôle	0,437*	0,224*	0,314	0,244
Locus de contrôle → Santé psychologique	**-0,044**	-0,109	**-0,053**	-0,114
Santé physique → Santé psychologique	0,282	0,254	0,296	0,268
Santé physique → Santé subjective	0,397*	0,284*	0,400	0,329
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,107	-0,070	-0,077	-0,090
Consommation d'alcool->Santé subjective	-0,168	-0,191	-0,222	-0,144
Instruction → Consommation d'alcool	0,192	0,182	0,126	0,165
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,028	0,006	0,007	-0,026
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,120	-0,164	-0,147	-0,142
Soutien social →Santé psychologique			0,204	0,129
Santé physique ↔ Instruction	-0,121	-0,090	-0,111	-0,093
Santé physique ↔ Soutien social			0,035	0,069
Soutien social ↔ Instruction			-0,062	-0,021

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
Les astérisques signifient que les paramètres sont statistiquement différents au sein de l'année considérée au seuil de 0,05.

Tableau 158 : Coefficients de régression, population féminine lituanienne selon l'ethnie et l'année.

	1994		1999	
	Lituaniennes	Non-Lituaniennes	Lituaniennes	Non-Lituaniennes
Santé psychologique → Santé subjective	0,240	0,178	0,245	0,263
Instruction → Locus de contrôle	0,387	0,343	0,250	0,237
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,077	-0,036	-0,100	0,014
Santé physique → Santé psychologique	0,288	0,390	0,259	0,362
Santé physique → Santé subjective	0,326	0,391	0,445	0,417
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,160	-0,086	-0,095	-0,015
Consommation d'alcool->Santé subjective	-0,159	-0,166	-0,163	-0,083
Instruction → Consommation d'alcool	0,305*	0,016*	0,170	0,112
Santé psychologique → Consommation d'alcool	-0,080	-0,090	0,009	0,034
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,098	**-0,124**	-0,069	-0,217
Soutien social →Santé psychologique			0,107	0,014
Santé physique ↔ Instruction	-0,099	-0,167	-0,084	-0,101
Santé physique ↔ Soutien social			0,032	0,034
Soutien social ↔ Instruction			-0,040	-0,032

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
Les astérisques signifient que les paramètres sont statistiquement différents au sein de l'année considérée au seuil de 0,05.

Tableau 159 : Coefficients de régression, population masculine selon le niveau économique, Estonie, 1994 et 1999.

	1994			1999		
	Niveau économique			Niveau économique		
	Faible	Moyen	Elevé	Faible	Moyen	Elevé
Santé psychologique → Santé subjective	0,127	0,147	0,171	0,205	0,159	0,157
Instruction → Locus de contrôle	0,581	0,476	0,524	0,418	0,522	0,409
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,075	-0,020	0,013	-0,041	-0,029	0,007
Santé physique → Santé psychologique	0,310	0,288	0,170	0,387	0,337	0,292
Santé physique → Santé subjective	0,554	0,533	0,456	0,477	0,514	0,466
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,120	-0,089	-0,063	-0,122	-0,089	-0,088
Consommation d'alcool → Santé subjective	-0,008	-0,059	-0,062	-0,044	**-0,036**	-0,006
Instruction → Consommation d'alcool	0,078	**0,074**	0,102	0,049	0,019	0,076
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,039	0,036	0,070	0,119	0,137	0,037
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,182[A]	-0,216	-0,081	-0,320[A]	-0,144	-0,142
Soutien social →Santé psychologique				-0,015	0,044	0,017
Santé physique ↔ Instruction	-0,076	-0,067	0,001	-0,094	-0,037	-0,005
Santé physique ↔ Soutien social				0,039	0,019	0,000
Soutien social ↔ Instruction				0,101	0,005	0,005

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
Aucun paramètre n'est significativement différent entre catégories économiques au seuil de 0.05 que ce soit en 1994 ou 1999.
[A] indique des paramètres significativement différents entre deux mêmes catégories économiques entre 1994 et 1999 au seuil de 0.05.

Tableau 160 : Coefficients de régression, population masculine selon le niveau économique, Lettonie, 1994 et 1999.

	1994			1999		
	Niveau économique			Niveau économique		
	Faible	Moyen	Elevé	Faible	Moyen	Elevé
Santé psychologique → Santé subjective	0,283	0,179	0,121	0,261[a]	0,175	0,081[a]
Instruction → Locus de contrôle	0,547	0,330	0,242	0,469	0,312	0,253
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,041	-0,043	-0,122	-0,075	0,021	-0,104
Santé physique → Santé psychologique	0,311	0,240	0,251	0,388	0,359	0,298
Santé physique → Santé subjective	0,387	0,423	0,530	0,447	0,419	0,564
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,077	-0,086	-0,072	-0,125	-0,113	-0,091
Consommation d'alcool → Santé subjective	-0,010	-0,086	-0,008	-0,028	-0,079	-0,036
Instruction → Consommation d'alcool	-0,024	0,055	-0,130	0,091	0,042	**0,105**
Santé psychologique → Consommation d'alcool	-0,074	0,010	-0,023	0,001	-0,015	-0,015
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,133	-0,210	-0,038	-0,264	-0,103	-0,054
Soutien social →Santé psychologique				-0,007	-0,005	-0,039
Santé physique ↔ Instruction	-0,087	-0,087	0,025	-0,070	-0,062	-0,029
Santé physique ↔ Soutien social				0,037	0,019	-0,011
Soutien social ↔ Instruction				-0,044	0,009	0,008

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
[a] indique des paramètres significativement différents entre catégories économiques au seuil de 0.05 en 1994 ou 1999.
Aucun paramètre n'est significativement différent entre deux mêmes catégories économiques entre 1994 et 1999 au seuil de 0.05.

Tableau 161 : Coefficients de régression, population masculine selon le niveau économique, Lituanie, 1994 et 1999.

	1994			1999		
	Niveau économique			Niveau économique		
	Faible	Moyen	Elevé	Faible	Moyen	Elevé
Santé psychologique → Santé subjective	0,153	0,163	0,130	0,228	0,200	0,251
Instruction → Locus de contrôle	0,212	0,342	0,517 [A]	0,168	0,217	0,216 [A]
Locus de contrôle → Santé psychologique	0,030	-0,115	-0,030	-0,026	-0,075	**-0,067**
Santé physique → Santé psychologique	0,467	0,421	0,320	0,363	0,303	0,323
Santé physique → Santé subjective	0,488	0,434	0,470 [A]	0,587	0,522	0,688 [A]
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,314[A]	-0,067	-0,073	0,015[A]	-0,037	-0,057
Consommation d'alcool → Santé subjective	-0,142	-0,063	-0,015	-0,044	-0,083	-0,051
Instruction → Consommation d'alcool	0,033	0,108	0,113	0,179	0,233	0,042
Santé psychologique → Consommation d'alcool	-0,219	-0,020	0,078	-0,099	0,073	-0,003
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,047	-0,206	-0,273	-0,276	-0,176	-0,086
Soutien social →Santé psychologique				-0,009	0,028	0,055
Santé physique ↔ Instruction	-0,083	-0,091	-0,052	-0,101	-0,047	-0,032
Santé physique ↔ Soutien social				0,004	0,048	0,007
Soutien social ↔ Instruction				-0,052	0,018	0,023

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
Aucun paramètre n'est significativement différent entre catégories économiques au seuil de 0.05 que ce soit en 1994 ou 1999.
[A] indique des paramètres significativement différents entre deux mêmes catégories économiques entre 1994 et 1999 au seuil de 0.05.

Tableau 162 : Coefficients de régression, population féminine selon le niveau économique, Estonie, 1994 et 1999.

	1994			1999		
	Niveau économique			Niveau économique		
	Faible	Moyen	Elevé	Faible	Moyen	Elevé
Santé psychologique → Santé subjective	0,131	0,187	0,152	0,228	0,131	0,150
Instruction → Locus de contrôle	0,495[A]	0,455	0,638[B]	0,233[A]	0,367	0,293[B]
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,063	-0,097	-0,041	-0,062	-0,089	-0,078
Santé physique → Santé psychologique	0,274	0,216	0,350	0,167	0,225	0,303
Santé physique → Santé subjective	0,545	0,498	0,499	0,507	0,494 [a]	0,396 [a]
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,075	-0,090	-0,138	-0,084	-0,122	-0,110
Consommation d'alcool → Santé subjective	-0,114	-0,113	-0,151 [A]	**-0,064**	-0,106	**-0,034**[A]
Instruction → Consommation d'alcool	0,198	0,200	0,248	0,104	0,145	0,182
Santé psychologique → Consommation d'alcool	-0,008	**-0,045**	-0,007	0,034	0,034	-0,018
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,105	-0,106	-0,164	-0,143	-0,119	-0,124
Soutien social →Santé psychologique				0,072	0,012	0,018
Santé physique ↔ Instruction	-0,072	-0,064	-0,040	-0,101	-0,094	**-0,020**
Santé physique ↔ Soutien social				0,131	0,015	0,008
Soutien social ↔ Instruction				-0,046	-0,032	**-0,018**

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
[a] indique des paramètres significativement différents entre catégories économiques au seuil de 0.05 en 1994 ou 1999.
[A, B] indiquent des paramètres significativement différents entre deux mêmes catégories économiques entre 1994 et 1999 au seuil de 0.05.

Tableau 163 : Coefficients de régression, population féminine selon le niveau économique, Lettonie, 1994 et 1999.

	1994			1999		
	Niveau économique			Niveau économique		
	Faible	Moyen	Elevé	Faible	Moyen	Elevé
Santé psychologique → Santé subjective	0,285	0,196	0,118	0,200	0,223	0,195
Instruction → Locus de contrôle	0,433	0,334	0,363	0,255	0,245	0,223
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,047	-0,087	-0,027	-0,067	-0,081	**-0,069**
Santé physique → Santé psychologique	0,200	0,281	0,276	0,265	0,295	0,263
Santé physique → Santé subjective	0,340	0,351	0,374	0,351	0,321	0,496
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,203	-0,115	**-0,094**	-0,042	-0,060	-0,113
Consommation d'alcool → Santé subjective	0,106 [a]	-0,209 [a]	-0,148	-0,134	-0,189	-0,137
Instruction → Consommation d'alcool	0,106	0,158	0,330	0,106	0,084	0,130
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,028	0,009	0,020	0,038	0,003	-0,029
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,093	-0,153	-0,129	-0,120	-0,141	-0,107
Soutien social →Santé psychologique				0,183	0,158	0,159
Santé physique ↔ Instruction	-0,091	-0,097	-0,024	-0,070	-0,076	-0,052
Santé physique ↔ Soutien social				0,058	0,052	0,008
Soutien social ↔ Instruction				-0,063	-0,007	-0,003

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
[a] indique des paramètres significativement différents entre catégories économiques au seuil de 0.05 en 1994 ou 1999.
Aucun paramètre n'est significativement différent entre deux mêmes catégories économiques entre 1994 et 1999 au seuil de 0.05.

Tableau 164 : Coefficients de régression., population féminine selon le niveau économique, Lituanie, 1994 et 1999.

	1994			1999		
	Niveau économique			Niveau économique		
	Faible	Moyen	Elevé	Faible	Moyen	Elevé
Santé psychologique → Santé subjective	0,248	0,241	0,212	0,278	0,184	0,288
Instruction → Locus de contrôle	0,389	0,387 [A]	0,461 [A]	0,269	0,175 [A]	0,204 [A]
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,186	-0,033	-0,049	-0,036	-0,068	-0,082
Santé physique → Santé psychologique	0,329	0,318	0,317	0,353	0,222	0,224
Santé physique → Santé subjective	0,423	0,394	0,336 [A]	0,357	0,443	0,512 [A]
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,113	-0,075	-0,188 [A]	-0,032	-0,071	-0,061 [A]
Consommation d'alcool->Santé subjective	-0,123	-0,133	-0,094	-0,182	-0,094	-0,131
Instruction → Consommation d'alcool	0,098	0,283	0,107	0,089	0,093	0,162
Santé psychologique → Consommation d'alcool	-0,110	-0,033	-0,083	-0,044	0,013	0,068
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,159	-0,109	-0,139	-0,082	-0,116	-0,021
Soutien social →Santé psychologique				0,143	0,007	0,050
Santé physique ↔ Instruction	-0,176	-0,129	-0,027	-0,087	-0,085	-0,023
Santé physique ↔ Soutien social				0,051	0,040	0,003
Soutien social ↔ Instruction				0,005	-0,017	-0,003

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
Aucun paramètre n'est significativement différent entre catégories économiques au seuil de 0.05 que ce soit en 1994 ou 1999.
[A] indique des paramètres significativement différents entre deux mêmes catégories économiques entre 1994 et 1999 au seuil de 0.05.

Tableau 165 : Coefficients de régression, population masculine estonienne, selon le groupe d'âge et l'année.

	1994				1999			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60+**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60+**
Santé psychologique → Santé subjective	0,172	0,176	0,122	0,129	0,210	0,154	0,210	0,138
Instruction → Locus de contrôle	0,482	0,590	0,483	0,446	0,493	0,528	0,505	0,292
Locus de contrôle → Santé psychologique	0,039	-0,046	-0,046	-0,087	0,009	**-0,057**	-0,017	-0,034
Santé physique → Santé psychologique	0,446	0,255	0,267	0,260	0,358	0,355	0,331	0,383
Santé physique → Santé subjective	0,404	0,454	0,500	0,402	0,551[a]	0,465	0,369	0,368[a]
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,057	-0,077	-0,074	-0,070	-0,064	-0,098	-0,065	**-0,048**
Consommation d'alcool → Santé subjective	-0,021	-0,007	-0,008	**-0,059**	-0,084	-0,004	-0,006	-0,026
Instruction → Consommation d'alcool	0,102	0,052	-0,029	0,046	0,120	0,027	0,028	0,030
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,164	0,013	-0,034	0,000	0,084	**0,116**	0,038	0,018
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,176[a]	0,154[abc]	-0,175[b]	-0,216[c]	-0,263	0,080	-0,174	-0,213
Soutien social →Santé psychologique					0,080	0,032	0,012	0,019
Santé physique ↔ Instruction	-0,009	-0,037	-0,053	**-0,052**	-0,023	-0,040	-0,024	-0,043
Santé physique ↔ Soutien social					0,005	0,012	0,015	0,022
Soutien social ↔ Instruction					0,025	-0,006	-0,055	0,058

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
a, b, c indiquent des paramètres significativement différents entre deux groupes d'âges pour une même année au seuil de 0,05.

Tableau 166 : Coefficients de régression, population masculine lettone, selon le groupe d'âge et l'année.

	1994				1999			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60+**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60+**
Santé psychologique → Santé subjective	0,165	0,208	0,161	0,297	0,069	0,157	0,178	0,214
Instruction → Locus de contrôle	0,309	0,393	0,314	0,409	0,289	0,322	0,353	0,395
Locus de contrôle → Santé psychologique	0,021	-0,108	-0,046	-0,072	-0,027	-0,032	-0,067	-0,078
Santé physique → Santé psychologique	0,440	0,341	0,221	0,260	0,588[a]	0,477[b]	0,389	0,237[ab]
Santé physique → Santé subjective	0,418	0,407	0,383	0,228	0,440	0,642[ab]	0,392[a]	0,306[b]
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,050	-0,041	-0,092	-0,048	-0,127	-0,051	-0,036	-0,085
Consommation d'alcool → Santé subjective	0,061	-0,039	-0,007	-0,049	-0,069	0,028	-0,022	**-0,063**
Instruction → Consommation d'alcool	-0,055	-0,031	-0,017	-0,019	0,227	0,013	0,055	-0,060
Santé psychologique → Consommation d'alcool	-0,065	-0,070	0,094	-0,111	0,065	0,064	-0,076	-0,091
Santé physique → Consommation d'alcool	0,090	0,103	-0,170	-0,175	-0,214	-0,005	-0,071	**-0,109**
Soutien social →Santé psychologique					0,111	-0,015	-0,053	0,011
Santé physique ↔ Instruction	-0,039	-0,037	-0,038	-0,054	0,008	-0,057	-0,039	-0,105
Santé physique ↔ Soutien social					0,001	-0,016	0,030	0,017
Soutien social ↔ Instruction					0,003	-0,027	-0,066	0,014

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
a, b, c indiquent des paramètres significativement différents entre deux groupes d'âges pour une même année au seuil de 0,05.

Tableau 167 : Coefficients de régression, population masculine lituanienne, selon le groupe d'âge et l'année.

	1994				1999			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60+**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60+**
Santé psychologique → Santé subjective	0,116	0,107	0,102	0,266	0,289	0,244	0,202	0,113
Instruction → Locus de contrôle	0,517	0,431	0,387	0,154	0,337	0,243	0,231	0,266
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,066	-0,102	0,000	-0,060	-0,093	-0,051	0,020	-0,091
Santé physique → Santé psychologique	0,332	0,377	0,288	0,340	0,348	0,353	0,336	0,288
Santé physique → Santé subjective	0,448	0,453[a]	0,301	0,236[a]	0,605	0,683[a]	0,522	0,457[a]
Locus de contrôle → Santé subjective	**-0,059**	-0,054	**-0,076**	-0,084	-0,004	-0,088	0,029	0,006
Consommation d'alcool → Santé subjective	0,051	-0,025	-0,065	-0,104	-0,050	-0,059	-0,016	-0,051
Instruction → Consommation d'alcool	-0,017	-0,055	0,038	-0,132	0,008	0,060	0,122	0,056
Santé psychologique → Consommation d'alcool	-0,005	0,147	-0,202	-0,019	0,058	-0,033	0,023	-0,048
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,229	-0,328	-0,210	-0,037	0,152	-0,233	-0,112	-0,211
Soutien social →Santé psychologique					0,059	0,001	**0,131**	-0,069
Santé physique ↔ Instruction	0,011	**-0,023**	-0,012	-0,038	-0,021	-0,014	-0,039	-0,054
Santé physique ↔ Soutien social					-0,008	0,022	0,024	0,032
Soutien social ↔ Instruction					-0,035	0,032	0,002	-0,002

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
[a, b, c] indiquent des paramètres significativement différents entre deux groupes d'âges pour une même année au seuil de 0,05.

Tableau 168 : Coefficients de régression, population féminine estonienne, selon le groupe d'âge et l'année.

	1994				1999			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60+**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60+**
Santé psychologique → Santé subjective	0,187	0,211	0,156	0,137	0,135	0,160	0,168	0,201
Instruction → Locus de contrôle	0,251[a]	0,595[ab]	0,461	0,351[b]	0,256	0,389	0,388	0,276
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,131	-0,089	-0,095	-0,046	-0,115	-0,110	-0,088	-0,106
Santé physique → Santé psychologique	0,329	0,249	0,223	0,292	0,336	0,308	0,251	0,256
Santé physique → Santé subjective	0,622[abc]	0,394[a]	0,463[b]	0,400[c]	0,520[a]	0,423	0,414	0,323[a]
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,095	-0,064	-0,056	-0,027	-0,079	-0,092	-0,112[a]	-0,020[a]
Consommation d'alcool → Santé subjective	0,039[abc]	-0,120[a]	-0,105[b]	-0,121[c]	0,000	**-0,038**	-0,059	**-0,062**
Instruction → Consommation d'alcool	0,098	0,305[ab]	0,106[a]	0,052[b]	0,207	0,139	0,081	0,095
Santé psychologique →Consommation d'alcool	0,001	-0,009	-0,067	-0,090	0,068	0,023	-0,069	-0,044
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,002	-0,096	-0,072	-0,028	-0,060	-0,097	-0,020	-0,089
Soutien social →Santé psychologique					0,016	0,067	-0,022	**0,064**
Santé physique ↔ Instruction	0,013	**-0,021**	-0,059	-0,006	-0,038	-0,030	-0,029	-0,036
Santé physique ↔ Soutien social					0,027	0,030	-0,001	0,020
Soutien social ↔ Instruction					-0,019	-0,010	-0,032	-0,050

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
[a, b, c] indiquent des paramètres significativement différents entre deux groupes d'âges pour une même année au seuil de 0,05.

Tableau 169 : Coefficients de régression, population féminine lettone, selon le groupe d'âge et l'année.

	1994				**1999**			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60+**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60+**
Santé psychologique → Santé subjective	0,178	0,256	0,161	0,224	0,244	0,161	0,178	0,238
Instruction → Locus de contrôle	0,245	0,383	0,355	0,223	0,394	0,257	0,220	0,288
Locus de contrôle → Santé psychologique	0,008	-0,030	-0,133	-0,115	-0,119	-0,062	-0,055	-0,062
Santé physique → Santé psychologique	0,388	0,351	0,237	0,228	0,391	0,253	0,388	0,243
Santé physique → Santé subjective	0,504[a]	0,317	0,325	0,220[a]	0,419	0,485[a]	0,331	0,223[a]
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,049	-0,100	-0,090	-0,052	0,020	-0,043	-0,098	**-0,052**
Consommation d'alcool → Santé subjective	0,023[a]	-0,061	-0,042[b]	-0,234[ab]	-0,028	-0,093	-0,149	-0,137
Instruction → Consommation d'alcool	0,082	0,126	0,078	0,054	0,094	0,152	0,117	**0,036**
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,128	0,046	-0,042	-0,011	0,054	-0,045	0,003	-0,004
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,183	-0,144	-0,121	-0,022	-0,185	-0,137	-0,105	-0,070
Soutien social →Santé psychologique					0,238	0,240	0,099	0,175
Santé physique ↔ Instruction	-0,012	**-0,027**	**-0,042**	-0,056	-0,002	-0,013	-0,052	-0,088
Santé physique ↔ Soutien social					-0,018	0,041	0,031	0,069
Soutien social ↔ Instruction					-0,032	-0,028	-0,043	-0,028

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
a, b, c indiquent des paramètres significativement différents entre deux groupes d'âges pour une même année au seuil de 0,05.

Tableau 170 : Coefficients de régression, population féminine lituanienne, selon le groupe d'âge et l'année.

	1994				**1999**			
	18-29	30-44	45-59	60+	18-29	30-44	45-59	60+
Santé psychologique → Santé subjective	0,256	0,185	0,187	0,265	0,283	0,228	0,211	0,221
Instruction → Locus de contrôle	0,379	0,493	0,352	0,266	0,337	0,315	0,237	0,163
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,125	0,020	-0,069	-0,068	-0,052	-0,083	**-0,118**	-0,055
Santé physique → Santé psychologique	0,428	0,234	0,299	0,276	0,387	0,232	0,291	0,240
Santé physique → Santé subjective	0,509[ab]	0,383[cd]	0,233[ac]	0,172[bd]	0,467	0,449[a]	0,367	0,269[a]
Locus de contrôle → Santé subjective	**-0,075**	-0,070	-0,132	-0,114	0,014	-0,075	-0,047	-0,059
Consommation d'alcool → Santé subjective	0,037[a]	-0,099	-0,162[a]	-0,073	0,004[a]	-0,077	-0,082	-0,165[a]
Instruction → Consommation d'alcool	0,208	0,088	0,098	0,104	0,111	0,099	0,091	0,050
Santé psychologique → Consommation d'alcool	-0,090	-0,090	-0,069	-0,057	0,189[a]	-0,011	0,000	-0,050[a]
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,106	-0,023	-0,061	-0,016	-0,067	0,016	-0,019	0,009
Soutien social →Santé psychologique					-0,012	0,072	0,118	0,089
Santé physique ↔ Instruction	**-0,018**	0,002	-0,045	-0,030	-0,003	-0,019	-0,076	0,038
Santé physique ↔ Soutien social					0,002	0,015	0,020	0,013
Soutien social ↔ Instruction					0,005	-0,024	-0,027	-0,017

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
a, b, c indiquent des paramètres significativement différents entre deux groupes d'âges pour une même année au seuil de 0,05.

Tableau 171 : Tailles des populations selon l'ethnie (effectifs non pondérés tels qu'utilisés par Amos), hommes et femmes, 1994 et 1999.

	Estonie		Lettonie		Lituanie	
	1994	**1999**	**1994**	**1999**	**1994**	**1999**
Hommes						
Ethnie du pays de résidence	1396	1261	763	705	887	986
Autres ethnies	738	598	528	491	179	160
Niveau économique faible	496	281	350	306	90	257
Niveau économique moyen	1260	720	761	487	435	365
Niveau économique élevé	375	854	180	403	280	507
Femmes						
Ethnie autochtone	1553	1877	1037	1087	1105	1359
Autres ethnies	768	990	804	761	240	238
Niveau économique faible	565	456	103	511	109	392
Niveau économique moyen	1438	1305	1089	821	623	583
Niveau économique élevé	316	1103	196	515	316	589

3.1.1. Santé physique → Santé subjective

3.1.1.1. Les taux de prévalence

Tableau 172 : Distribution de la population selon l'état de santé physique, selon le pays, le sexe et la date.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	1994		1999		1994		1999		1994		1999	
	H	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**
Aucune maladie	58,8	48,8	68,4	60,4	68,3	63,5	73,6	70,1	72,8	64,8	87,8	81,3
Maladie avec de légères limitations	31,5	37,4	24,9	28,8	21,0	20,3	18,6	18,3	14,6	18,1	7,2	9,4
Maladies avec de sévères limitations	9,6	13,8	6,7	10,8	10,7	16,2	7,8	11,6	12,6	17,1	5,0	9,3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre hommes et femmes est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 173A : Distribution de la population selon l'état de santé physique, selon le pays, le sexe et la date.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.
Aucune maladie	58,8	68,3	72,8	68,4	73,6	87,8	48,8	63,5	64,8	60,4	70,1	81,3
Maladie avec de légères limitations	31,5	21,0	14,6	24,9	18,6	7,2	37,4	20,3	18,1	28,8	18,3	9,4
Maladies avec de sévères limitations	9,6	10,7	12,6	6,7	7,8	5,0	13,8	16,2	17,1	10,8	11,6	9,3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101.90%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 173B : Comparaison des proportions, santé physique, sexe masculin.

	1994			1999		
	Estonie	Lettonie	Lituanie	Estonie	Lettonie	Lituanie
Aucune maladie		Est.	Est.		Est.	Est.-Lett.
Maladie avec de légères limitations	Lett.-Lit.	Lit.		Lett.-Lit.	Lit.	
Maladies avec de sévères limitations			Est.		Lit.	

Tableau 173C : Comparaison des proportions, santé physique, sexe féminin.

	1994			1999		
	Estonie	Lettonie	Lituanie	Estonie	Lettonie	Lituanie
Aucune maladie		Est.	Est.		Est.	Est.-Lett.
Maladie avec de légères limitations	Lett.-Lit.			Lett.-Lit.	Lit.	
Maladies avec de sévères limitations			Est.			

Tableau 174 : Distribution de la population selon l'état de santé physique et selon l'ethnie, Estonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	Non-Estoniens	Estoniens	Non-Estoniens
Aucune maladie	57,2	61,8	48,3	49,8
Maladie avec de légères limitations	33,1	28,6	39,1	34,0
Maladies avec de sévères limitations	9,7	9,6	12,6	16,2
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 175 : Distribution de la population selon l'état de santé physique et selon l'ethnie, Lettonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Aucune maladie	64,8	73,2	60,1	67,7
Maladie avec de légères limitations	22,9	18,3	22,2	17,8
Maladies avec de sévères limitations	12,3	8,6	17,7	14,5
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 176 : Distribution de la population selon l'état de santé physique et selon l'ethnie, Lituanie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Aucune maladie	73,6	69,2	65,8	60,6
Maladie avec de légères limitations	13,9	17,9	17,7	19,6
Maladies avec de sévères limitations	12,5	12,9	16,5	19,9
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 177 : Distribution de la population selon l'état de santé physique et selon l'ethnie, Estonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniens**	**Non-Estoniens**
Aucune maladie	67,8	69,5	62,1	57,4
Maladie avec de légères limitations	25,3	24,1	26,6	32,8
Maladies avec de sévères limitations	6,9	6,3	11,4	9,8
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 178 : Distribution de la population selon l'état de santé physique et selon l'ethnie, Lettonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Aucune maladie	74,0	73,1	72,9	66,3
Maladie avec de légères limitations	16,9	20,8	16,0	21,6
Maladies avec de sévères limitations	9,1	6,1	11,1	12,1
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que l'augmentation ou la diminution des proportions entre 1994 et 1999 est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 179 : Distribution de la population selon l'état de santé physique et selon l'ethnie, Lituanie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Aucune maladie	88,2	85,4	82,2	76,5
Maladie avec de légères limitations	6,6	10,5	8,8	12,7
Maladies avec de sévères limitations	5,2	4,2	9,0	10,8
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 180A : Distribution de la population selon l'état de santé physique, le sexe, l'année et le groupe économique. **Estonie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Aucune maladie	54.5	58.0	66.7	58.6	67.2	72.3	44.0	48.4	58.4	51.2	57.3	67.3
Maladie avec de légères limitations	31.6	32.0	30.1	26.9	24.2	24.9	35.6	38.6	35.1	24.4	30.7	28.5
Maladies avec de sévères limitations	13.9	10.0	3.2	14.5	8.6	2.8	20.4	13.1	6.6	24.4	12.0	4.2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 180B : Comparaison des proportions, santé physique.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Aucune maladie			FM		F	F			FM			FM
Maladie avec de légères limitations							ME					
Maladies avec de sévères limitations	E	E		ME	E			E		ME	E	

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 181A : Distribution de la population selon l'état de santé physique, le sexe, l'année et le groupe économique. **Lettonie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Aucune maladie	66.7	67.6	74.2	71.4	68.8	80.1	57.1	64.4	75.7	64.9	66.4	79.9
Maladie avec de légères limitations	17.1	22.6	21.5	16.4	21.7	16.5	19.9	20.9	17.9	18.1	20.2	15.8
Maladies avec de sévères limitations	16.2	9.8	4.3	12.2	9.6	3.3	23.0	14.7	6.4	17.0	13.4	4.3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 181B : Comparaison des proportions, santé physique.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Aucune maladie						FM		F	FM			FM
Maladie avec de légères limitations												
Maladies avec de sévères limitations	ME			E	E		ME	E		E	E	

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 182A : Distribution de la population selon l'état de santé physique, le sexe, l'année et le groupe économique. **Lituanie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Aucune maladie	70.9	69.8	75.2	85.2	84.6	90.5	65.4	60.6	69.4	81.9	77.7	83.5
Maladie avec de légères limitations	11.1	17.5	17.4	5.4	8.3	7.3	12.5	19.7	23.9	6.7	9.7	11.0
Maladies avec de sévères limitations	18.1	12.7	7.4	9.4	7.1	2.1	22.2	19.8	6.7	11.4	12.6	5.4
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 182B : Comparaison des proportions, santé physique.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Aucune maladie						M			M			
Maladie avec de légères limitations									F			
Maladies avec de sévères limitations	E			E	E		E	E		E	E	

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 183A : Distribution de la population masculine selon la santé physique le pays et le groupe d'âge, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus
Aucune maladie	77.0	67.2	48.4	40.4	84.7	77.8	63.4	49.3	87.1	79.9	66.7	52.9
Maladie avec de légères limitations	21.2	30.3	39.2	34.3	12.9	19.0	26.0	24.3	10.1	15.7	19.1	13.3
Maladies avec de sévères limitations	1.9	2.5	12.4	25.3	2.4	3.3	10.6	26.5	2.9	4.4	14.3	33.7
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 183B : Comparaison des proportions selon l'état de santé physique et le groupe d'âge, population masculine, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Aucune maladie	BCD	CD			CD	CD	D		CD	CD	D	
Maladie avec de légères limitations		A	AB	A			A	A			A	
Maladies avec de sévères limitations			AB	ABC			AB	ABC			AB	ABC
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 184A : Distribution de la population féminine selon la santé physique le pays et le groupe d'âge, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Aucune maladie	70.6	57.2	42.5	30.0	83.5	73.8	59.2	49.3	88.6	69.9	55.4	49.9
Maladie avec de légères limitations	26.4	35.7	45.5	38.8	13.4	20.4	28.3	17.0	9.1	23.7	22.7	14.9
Maladies avec de sévères limitations	3.0	7.0	12.0	31.2	3.1	5.7	12.5	33.7	2.3	6.4	21.9	35.2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 184B : Comparaison des proportions selon l'état de santé physique et le groupe d'âge, population féminine, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Aucune maladie	BCD	CD	D		BCD	CD	D		BCD	CD		
Maladie avec de légères limitations		A	AB	A			ABD			AD	A	
Maladies avec de sévères limitations		A	AB	ABC			AB	ABC			AB	ABC
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 185A : Distribution de la population masculine selon la santé physique le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Aucune maladie	84.5	73.1	62.5	46.2	82.9	79.3	70.5	56.9	91.9	90.0	88.1	76.0
Maladie avec de légères limitations	13.5	24.7	30.5	33.6	14.5	17.6	21.6	21.7	5.9	8.7	5.2	8.6
Maladies avec de sévères limitations	2.0	2.3	7.0	20.2	2.6	3.2	7.9	21.4	2.2	1.3	6.6	15.4
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 185B : Comparaison des proportions selon l'état de santé physique et le groupe d'âge, population masculine, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Aucune maladie	BCD	CD	D		CD	CD	D		D	D	D	
Maladie avec de légères limitations		A	A	AB								
Maladies avec de sévères limitations			AB	ABC			AB	ABC			B	ABC
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 186A : Distribution de la population féminine selon la santé physique le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Aucune maladie	81.0	69.4	55.1	40.6	82.2	76.7	70.5	56.0	91.6	88.1	74.8	67.4
Maladie avec de légères limitations	17.0	27.2	37.3	31.3	16.3	19.4	21.1	16.5	5.9	9.4	13.2	9.9
Maladies avec de sévères limitations	2.0	3.4	7.6	28.2	1.4	3.8	8.4	27.5	2.4	2.5	11.9	22.8
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 186B : Comparaison des proportions selon l'état de santé physique et le groupe d'âge, population féminine, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Aucune maladie	BCD	CD	D		CD	D	D		CD	CD		
Maladie avec de légères limitations		A	AB	A							A	
Maladies avec de sévères limitations			AB	ABC			AB	ABC			AB	ABC
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 187 : Distribution de la population selon l'état de santé physique selon le pays, le sexe, la date et le groupe d'âge.

		Estonie				Lettonie			
		Hommes		**Femmes**		**Hommes**		**Femmes**	
		1994	**1999**	**1994**	**1999**	**1994**	**1999**	**1994**	**1999**
18-29 ans	**Aucune maladie**	77.0	84.5	70.6	80.3	84.7	82.9	83.5	82.5
	Maladie avec de légères limitations	21.2	13.5	26.4	17.6	12.9	14.5	13.4	16.2
	Maladies avec de sévères limitations	1.9	2.0	3.0	2.1	2.4	2.6	3.1	1.3
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
30-44 ans	**Aucune maladie**	67.2	73.1	57.2	69.7	77.8	79.3	73.8	77.1
	Maladie avec de légères limitations	30.3	24.7	35.7	26.7	19.0	17.6	20.4	19.2
	Maladies avec de sévères limitations	2.5	2.3	7.0	3.5	3.3	3.2	5.7	1.3
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
45-59 ans	**Aucune maladie**	48.4	62.5	42.5	54.9	63.4	70.5	59.2	70.3
	Maladie avec de légères limitations	39.2	30.5	45.5	37.5	26.0	21.6	28.3	21.4
	Maladies avec de sévères limitations	12.4	7.0	12.0	7.6	10.6	7.9	12.5	8.4
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
60 ans et +	**Aucune maladie**	40.4	46.2	30.0	40.2	49.3	56.9	49.3	56.4
	Maladie avec de légères limitations	34.3	33.6	38.8	31.5	24.3	21.7	17.0	16.6
	Maladies avec de sévères limitations	25.3	20.2	31.2	28.3	26.5	21.4	33.7	27.1
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Les cellules grisées indiquent que l'augmentation ou la diminution des proportions entre 1994 et 1999 est statistiquement significative au seuil de 0,05.

		Lituanie			
		Hommes		Femmes	
		1994	1999	1994	1999
18-29 ans	Aucune maladie	87.1	91.9	88.6	91.1
	Maladie avec de légères limitations	10.1	5.9	9.1	6.4
	Maladies avec de sévères limitations	2.9	2.2	2.3	2.4
		100 %	100 %	100 %	100 %
30-44 ans	Aucune maladie	79.9	90.0	69.9	88.4
	Maladie avec de légères limitations	15.7	8.7	23.7	9.3
	Maladies avec de sévères limitations	4.4	1.3	6.4	2.4
		100 %	100 %	100 %	100 %
45-59 ans	Aucune maladie	66.7	88.1	55.4	76.0
	Maladie avec de légères limitations	19.1	5.2	22.7	12.4
	Maladies avec de sévères limitations	14.3	6.6	21.9	11.6
		100 %	100 %	100 %	100 %
60 ans et +	Aucune maladie	52.9	76.0	49.9	66.5
	Maladie avec de légères limitations	13.3	8.6	14.9	9.8
	Maladies avec de sévères limitations	33.7	15.4	35.2	23.6
		100 %	100 %	100 %	100 %

Les cellules grisées indiquent que l'augmentation ou la diminution des proportions entre 1994 et 1999 est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 188 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique, selon le pays, le sexe et la date.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	1994		1999		1994		1999		1994		1999	
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bonne	36,5	19,7	50,4	32,8	48,1	23,3	50,7	30,5	52,8	26,7	61,1	35,7
Moyenne	40,1	38,3	36,7	44,8	34,7	38,8	33,3	38,0	33,5	41,6	29,6	41,2
Mauvaise	23,4	42,0	13,0	22,4	17,2	37,9	16,0	31,4	13,7	31,7	9,3	23,0
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre hommes et femmes est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 189A : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique, selon le pays, le sexe et la date.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.
Bonne	36,5	48,1	52,8	50,4	50,7	61,1	19,7	23,3	26,7	32,8	30,5	35,7
Moyenne	40,1	34,7	33,5	36,7	33,3	29,6	38,3	38,8	41,6	44,8	38,0	41,2
Mauvaise	23,4	17,2	13,7	13,0	16,0	9,3	42,0	37,9	31,7	22,4	31,4	23,0
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 189B : Comparaison des proportions, santé psychologique, sexe masculin

	1994			1999		
	Estonie	**Lettonie**	**Lituanie**	**Estonie**	**Lettonie**	**Lituanie**
Bonne		Est.	Est.			Est. – Lett.
Moyenne	Lett. - Lit.			Lit.		
Mauvaise	Lett. - Lit.			Lit.	Est. – Lit.	

Tableau 189C : Comparaison des proportions, santé psychologique, sexe féminin

	1994			1999		
	Estonie	**Lettonie**	**Lituanie**	**Estonie**	**Lettonie**	**Lituanie**
Bonne		Est.	Est.			Lett.
Moyenne				Lett.		
Mauvaise	Lett. – Lit.	Lit.			Est. – Lit.	

Tableau 190 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique et selon l'ethnie, Estonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniens**	**Non-Estoniens**
Bonne	38,2	33,6	21,8	15,6
Moyenne	42,1	36,5	40,9	33,3
Mauvaise	19,8	29,9	37,3	51,1
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 191 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique et selon l'ethnie, Lettonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Bonne	45,6	51,5	24,2	22,2
Moyenne	38,2	29,9	40,3	36,8
Mauvaise	16,2	18,6	35,5	41,0
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 192 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique et selon l'ethnie, Lituanie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Bonne	53,0	51,8	27,4	23,5
Moyenne	33,7	32,8	41,6	41,6
Mauvaise	13,3	15,5	31,0	34,9
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 193 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique et selon l'ethnie, Estonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniens**	**Non-Estoniens**
Bonne	49,2	52,6	33,2	32,1
Moyenne	38,2	33,6	43,8	46,6
Mauvaise	12,5	13,9	23,0	21,2
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 194 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique et selon l'ethnie, Lettonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Bonne	50,6	50,9	33,2	26,8
Moyenne	33,5	33,0	36,2	40,6
Mauvaise	16,0	16,1	30,5	32,7
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 195 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique et selon l'ethnie, Lituanie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Bonne	60,8	62,9	36,5	31,8
Moyenne	30,4	24,8	41,0	42,5
Mauvaise	8,8	12,3	22,6	25,8
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 196A : Distribution de la population selon la santé psychologique, le sexe, l'année et le groupe économique. **Estonie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Bonne	35.9	36.0	39.2	42.9	51.6	51.4	23.0	18.0	21.4	26.4	30.4	38.2
Moyenne	39.7	39.6	41.9	37.1	35.9	37.4	33.4	39.3	42.3	44.6	44.9	44.9
Mauvaise	24.4	24.3	18.9	19.9	12.5	11.2	43.6	42.8	36.3	29.0	24.7	16.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 196B : Comparaison des proportions, santé psychologique.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Bonne					F	F	M					FM
Moyenne								F	F			
Mauvaise				ME						E	E	

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 197A : Distribution de la population selon la santé psychologique, le sexe, l'année et le groupe économique. **Lettonie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Bonne	45.0	48.0	53.9	48.0	48.2	55.0	21.7	22.3	33.5	28.0	28.7	35.3
Moyenne	34.1	35.6	32.3	35.0	31.4	34.3	36.1	39.5	41.8	36.8	36.0	41.7
Mauvaise	20.9	16.4	13.9	17.0	20.4	10.7	42.2	38.2	24.7	35.1	35.3	23.0
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 197B : Comparaison des proportions, santé psychologique.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Bonne									FM			
Moyenne												
Mauvaise				E	E		E	E		E	E	

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 198A : Distribution de la population selon la santé psychologique, le sexe, l'année et le groupe économique. **Lituanie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Bonne	49.5	51.5	58.0	60.8	56.7	64.1	24.1	25.8	30.9	34.6	32.8	39.4
Moyenne	32..0	34.1	34.0	27.2	31.4	29.3	37.5	38.8	49.1	36.6	41.2	43.8
Mauvaise	18.4	14.5	8.0	11.9	11.8	6.6	38.3	35.4	20.0	28.9	26.0	16.8
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 198B : Comparaison des proportions, santé psychologique.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Bonne												
Moyenne									M			
Mauvaise	E	E		E	E		E	E		E	E	

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 199A : Distribution de la population masculine selon la santé psychologique le pays et le groupe d'âge, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus
Bonne	42.9	33.2	34.3	37.3	53.7	46.1	48.4	45.5	64.9	59.2	46.5	36.6
Moyenne	42.4	42.3	40.1	33.9	34.1	38.8	31.7	33.9	27.6	31.7	37.8	38.2
Mauvaise	14.7	24.5	25.6	28.8	12.2	15.2	19.9	20.6	7.5	9.1	15.7	25.2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 199B : Comparaison des proportions selon l'état de santé psychologique et le groupe d'âge, population masculine, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	30-44 (B)	45-59 (C)	60 et plus (D)	18-29 (A)	30-44 (B)	45-59 (C)	60 et plus (D)	18-29 (A)	30-44 (B)	45-59 (C)	60 et plus (D)
Bonne	BC								CD	CD		
Moyenne		D										
Mauvaise		A	A	A							A	AB
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 200A : Distribution de la population féminine selon la santé psychologique le pays et le groupe d'âge, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus
Bonne	22.8	19.6	16.3	20.7	31.0	21.3	22.5	21.9	34.5	30.1	23.9	19.9
Moyenne	41.5	40.7	38.9	32.9	42.5	46.6	34.4	34.2	47.8	43.3	36.3	40.0
Mauvaise	35.8	39.8	44.8	46.4	26.5	32.1	43.1	43.9	17.7	26.6	39.8	40.1
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 200B : Comparaison des proportions selon l'état de santé psychologique et le groupe d'âge, population féminine, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	30-44 (B)	45-59 (C)	60 et plus (D)	18-29 (A)	30-44 (B)	45-59 (C)	60 et plus (D)	18-29 (A)	30-44 (B)	45-59 (C)	60 et plus (D)
Bonne					BD				CD	D		
Moyenne	D	D				CD			C			
Mauvaise			A	A			AB	AB		A	AB	AB
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 201A : Distribution de la population masculine selon la santé psychologique le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Bonne	58.3	47.3	46.3	49.9	59.7	52.1	45.8	43.7	71.7	59.6	58.3	53.1
Moyenne	33.0	40.9	36.5	35.0	25.4	34.1	36.5	37.5	23.1	32.0	29.6	34.1
Mauvaise	8.6	11.8	17.2	15.1	14.9	13.8	17.7	18.8	5.2	8.5	12.0	12.8
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 201B : Comparaison des proportions selon l'état de santé psychologique et le groupe d'âge, population masculine, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Bonne	BC				CD				BCD			
Moyenne							A	A				A
Mauvaise			A	A							A	A
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 202A : Distribution de la population féminine selon la santé psychologique le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Bonne	35.1	33.0	27.9	33.4	40.2	29.6	26.4	27.1	41.4	34.8	35.3	31.8
Moyenne	48.0	45.5	47.1	40.7	39.1	41.7	37.8	35.3	43.9	44.9	37.3	38.6
Mauvaise	16.9	21.4	25.0	25.9	20.7	28.7	35.8	37.6	14.7	20.3	27.4	29.6
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 202B : Comparaison des proportions selon l'état de santé psychologique et le groupe d'âge, population féminine, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Bonne					BCD							
Moyenne												
Mauvaise			A	A			A	AB			A	AB
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 203 : Distribution de la population selon la santé psychologique, selon le pays, le sexe, la date et le groupe d'âge.

		Estonie				Lettonie			
		Hommes		**Femmes**		**Hommes**		**Femmes**	
		1994	**1999**	**1994**	**1999**	**1994**	**1999**	**1994**	**1999**
18-29 ans	**Bonne**	42,9	58,3	22,8	37,6	53,7	59,7	31,0	40,7
	Moyenne	42,4	33,0	41,5	46,6	34,1	25,4	42,5	38,9
	Mauvaise	14,7	8,6	35,8	15,9	12,2	14,9	26,5	20,4
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
30-44 ans	**Bonne**	33,2	47,3	19,6	33,4	46,1	52,1	21,3	30,1
	Moyenne	42,3	40,9	40,7	45,3	38,8	34,1	46,6	41,8
	Mauvaise	24,5	11,8	39,8	21,3	15,2	13,8	32,1	28,1
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
45-59 ans	**Bonne**	34,3	46,3	16,3	28,4	48,4	45,8	22,5	26,5
	Moyenne	40,1	36,5	38,9	47,6	31,7	36,5	34,4	37,2
	Mauvaise	25,6	17,2	44,8	24,0	19,9	17,7	43,1	36,3
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
60 ans et +	**Bonne**	37,3	49,9	20,7	32,8	45,5	43,7	21,9	27,7
	Moyenne	33,9	35,0	32,9	41,1	33,9	37,5	34,2	34,9
	Mauvaise	28,8	15,1	46,4	26,1	20,6	18,8	43,9	37,3
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Les cellules grisées indiquent que l'augmentation ou la diminution des proportions entre 1994 et 1999 est statistiquement significative au seuil de 0,05.

		Lituanie			
		Hommes		Femmes	
		1994	1999	1994	1999
18-29 ans	**Bonne**	64,9	71,7	34,5	41,9
	Moyenne	27,6	23,1	47,8	43,7
	Mauvaise	7,5	5,2	17,7	14,4
		100 %	100 %	100 %	100 %
30-44 ans	**Bonne**	59,2	59,6	30,1	34,7
	Moyenne	31,7	32,0	43,3	45,4
	Mauvaise	9,1	8,5	26,6	19,9
		100 %	100 %	100 %	100 %
45-59 ans	**Bonne**	46,5	58,3	23,9	35,8
	Moyenne	37,8	29,6	36,3	37,1
	Mauvaise	15,7	12,0	39,8	27,1
		100 %	100 %	100 %	100 %
60 ans et +	**Bonne**	36,6	53,1	19,9	32,0
	Moyenne	38,2	34,1	40,0	38,4
	Mauvaise	25,2	12,8	40,1	29,6
		100 %	100 %	100 %	100 %

Les cellules grisées indiquent que l'augmentation ou la diminution des proportions entre 1994 et 1999 est statistiquement significative au seuil de 0,05.

3.1.3. Consommation d'alcool → Santé subjective

3.1.3.1. Les taux de prévalence

Tableau 204 : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines), selon le pays, le sexe et la date.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	1994		1999		1994		1999		1994		1999	
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Abstème	27,0	50,5	31,8	54,6	32,8	58,4	39,3	62,0	28,6	54,0	35,6	65,9
1 jour	38,9	38,6	32,2	31,9	46,2	37,1	38,8	31,5	34,4	36,1	32,3	25,3
2 ou 3 jours	24,3	9,0	22,8	11,3	15,8	4,1	15,3	5,4	24,7	7,8	21,9	6,6
4 jours ou plus	9,9	1,9	13,3	2,2	5,2	0,4	6,6	1,1	12,2	2,1	10,2	2,2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre hommes et femmes est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 205A : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines, selon le pays, le sexe et la date.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.
Abstème	27,0	32,8	28,6	31,8	39,3	35,6	50,5	58,4	54,0	54,6	62,0	65,9
1 jour	38,9	46,2	34,4	32,2	38,8	32,3	38,6	37,1	36,1	31,9	31,5	25,3
2 ou 3 jours	24,3	15,8	24,7	22,8	15,3	21,9	9,0	4,1	7,8	11,3	5,4	6,6
4 jours et plus	9,9	5,2	12,2	13,3	6,6	10,2	1,9	0,4	2,1	2,2	1,1	2,2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 205B : Comparaison des proportions, consommation d'alcool, sexe masculin

	1994			1999		
	Estonie	Lettonie	Lituanie	Estonie	Lettonie	Lituanie
Abstème		Est.			Est.	
1 jour		Est.- Lit.			Est.-Lit.	
2 ou 3 jours	Lett.		Lett.	Lett.		Lett.
4 jours et plus	Lett.		Lett.	Lett.-Lit.		Lett.

Tableau 205C : Comparaison des proportions, consommation d'alcool, sexe féminin

	1994			1999		
	Estonie	Lettonie	Lituanie	Estonie	Lettonie	Lituanie
Abstème		Est.			Est.	Est.
1 jour				Lit.	Lit.	
2 ou 3 jours	Lett.		Lett.	Lett -Lit.		
4 jours et plus	Lett.		Lett.			

Tableau 206 : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines) et selon l'ethnie, Estonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	Non-Estoniens	Estoniens	Non-Estoniens
Abstème	25,0	30,3	47,0	57,0
1 jour	37,6	41,0	41,7	32,8
2 ou 3 jours	25,0	22,9	9,4	8,3
4 jours ou plus	12,3	5,7	1,9	1,8
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 207 : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines) et selon l'ethnie, Lettonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Abstème	31,1	35,0	60,0	56,4
1 jour	47,1	45,0	35,6	38,9
2 ou 3 jours	16,4	15,1	3,9	4,4
4 jours ou plus	5,5	4,9	0,4	0,4
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 208 : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines) et selon l'ethnie, Lituanie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Abstème	28,3	30,2	55,2	48,9
1 jour	35,6	29,0	34,5	43,1
2 ou 3 jours	23,6	29,6	8,3	5,3
4 jours ou plus	12,5	11,1	2,0	2,7
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 209 : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines) et selon l'ethnie, Estonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniens**	**Non-Estoniens**
Abstème	29,5	36,5	53,4	57,0
1 jour	32,9	30,8	32,7	30,4
2 ou 3 jours	23,8	20,8	11,5	11,0
4 jours ou plus	13,8	12,2	2,4	1,7
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 210 : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines) et selon l'ethnie, Lettonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Abstème	38,5	40,3	61,2	63,1
1 jour	40,6	36,5	32,6	30,1
2 ou 3 jours	14,3	16,7	5,5	5,1
4 jours ou plus	6,6	6,5	0,7	1,7
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 211 : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines) et selon l'ethnie, Lituanie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Abstème	34,2	45,1	66,0	65,6
1 jour	34,2	19,6	25,4	24,7
2 ou 3 jours	21,4	25,2	7,0	4,5
4 jours ou plus	10,2	10,1	1,7	5,1
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 212A : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines), le sexe, l'année et le groupe économique. **Estonie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Abstème	30.1	28.4	18.0	42.7	38.0	23.3	58.1	51.4	34.0	73.0	58.6	42.1
1 jour	33.6	39.8	42.6	24.3	30.3	36.3	31.9	39.1	47.8	18.5	31.1	38.5
2 / 3 jours	25.0	23.2	26.7	19.1	20.1	26.0	8.1	7.7	15.8	5.9	9.0	16.5
4 jours ou plus	11.3	8.6	12.8	13.9	11.6	14.4	2.0	1.8	2.4	2.7	1.4	2.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 212B : Comparaison des proportions, fréquence de consommation d'alcool.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Abstème	E	E		E	E		ME	E		ME	E	
1 jour			F			FM		F	FM		F	FM
2 / 3 jours						M			FM			FM
4 jours ou plus			M									

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 213A : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines), le sexe, l'année et le groupe économique. **Lettonie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Abstème	37.3	33.0	23.4	45.4	41.0	33.8	69.1	56.6	39.2	71.3	69.5	43.3
1 jour	37.8	48.1	54.0	31.5	37.0	45.1	26.1	39.8	52.0	22.3	27.1	45.7
2 / 3 jours	17.8	15.4	13.9	13.1	15.3	16.6	4.2	3.4	7.8	5.3	3.0	8.8
4 jours ou plus	7.0	3.6	8.6	10.0	6.7	4.4	0.6	0.2	1.0	1.1	0.4	2.2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 213B : Comparaison des proportions, fréquence de consommation d'alcool.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Abstème	E	E		E			ME	E		E	E	
1 jour		F	F			FM		F	FM			FM
2 / 3 jours									M			M
4 jours ou plus	M		M	E								M

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 214A : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines), le sexe, l'année et le groupe économique. **Lituanie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Abstème	38.0	29.6	23.6	39.0	45.0	27.7	60.0	53.7	37.2	79.8	69.5	53.4
1 jour	33.4	37.1	33.3	26.2	30.8	36.3	32.4	37.8	47.7	14.2	23.6	34.4
2 / 3 jours	21.2	20.2	30.9	23.6	15.0	25.4	7.6	6.3	12.7	3.8	5.6	9.1
4 jours ou plus	7.4	13.0	12.2	11.2	9.2	10.6	0.0	2.2	2.5	2.1	1.3	3.1
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 214B : Comparaison des proportions, fréquence de consommation d'alcool.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Abstème	E			E	E		E	E		ME	E	
1 jour						F			FM		F	FM
2 / 3 jours			M	M		M			M			F
4 jours ou plus												

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 215A : Distribution de la population masculine selon la fréquence de consommation d'alcool, le pays et le groupe d'âge, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus
Abstème	22.5	17.4	23.8	50.6	24.7	25.0	29.9	51.6	22.6	18.7	29.8	49.0
1 jour	40.3	40.7	41.9	30.1	55.7	45.4	47.8	37.7	38.2	35.4	30.8	32.7
2 ou 3 jours	23.9	30.8	24.9	14.0	14.1	22.1	16.5	9.0	29.5	29.5	26.6	10.3
4 jours ou plus	13.4	11.1	9.4	5.3	5.5	7.5	5.8	1.6	9.8	16.5	12.8	8.1
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 215B : Comparaison des proportions selon la fréquence de consommation d'alcool et le groupe d'âge, population masculine, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Abstème			B	ABC				ABC			B	ABC
1 jour	D	D	D		D							
2 ou 3 jours	D	D	D			D	D		D	D	D	
4 jours ou plus	D	D				D	D			D		
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 216A : Distribution de la population féminine selon la fréquence de consommation d'alcool, le pays et le groupe d'âge, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Abstème	41.0	36.3	49.9	74.9	35.2	40.8	58.9	83.3	35.2	37.0	59.9	81.3
1 jour	45.6	48.0	40.1	20.8	55.7	52.7	36.3	16.2	46.5	49.5	33.4	16.2
2 ou 3 jours	11.2	13.1	8.4	3.2	8.3	5.7	4.6	0.5	15.0	9.6	6.0	1.9
4 jours ou plus	2.3	2.6	1.6	1.1	0.8	0.9	0.2	0.0	3.4	3.9	0.7	0.6
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 216B : Comparaison des proportions selon la fréquence de consommation d'alcool et le groupe d'âge, population féminine, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Abstème			AB	ABC			AB	ABC			AB	ABC
1 jour	D	CD	D		CD	CD	D		CD	CD	D	
2 ou 3 jours	D	D	D		D	D	D		CD	D	D	
4 jours ou plus										CD		
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 217A : Distribution de la population masculine selon la fréquence de consommation d'alcool, le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Abstème	27.9	24.0	31.1	48.7	35.5	29.4	42.7	55.2	30.9	25.4	35.6	57.3
1 jour	41.6	31.5	28.6	26.3	42.7	41.2	36.9	33.0	40.6	36.9	27.3	20.6
2 ou 3 jours	22.3	26.4	26.4	13.8	15.5	22.0	13.2	7.1	21.8	26.2	23.7	13.3
4 jours ou plus	8.2	18.0	13.9	11.3	6.3	7.5	7.2	4.7	6.7	11.4	13.5	8.9
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 217B : Comparaison des proportions selon la fréquence de consommation d'alcool et le groupe d'âge, population masculine, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Abstème				ABC			B	ABC			B	ABC
1 jour	BCD								CD	D		
2 ou 3 jours	D	D	D		D	CD				D	D	
4 jours ou plus		AD	A									
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 218A : Distribution de la population féminine selon la fréquence de consommation d'alcool, le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Abstème	46.4	41.3	49.3	75.5	48.7	47.5	60.2	84.2	56.0	50.5	69.1	87.2
1 jour	38.0	39.2	36.4	19.6	42.2	42.8	33.6	13.8	31.7	36.4	25.9	9.0
2 ou 3 jours	13.2	16.9	11.2	4.3	7.2	8.1	5.3	1.5	9.0	9.7	5.0	2.6
4 jours ou plus	2.5	2.6	3.1	0.5	1.8	1.6	0.9	0.5	3.4	3.4	0.0	1.1
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 218B: Comparaison des proportions selon la fréquence de consommation d'alcool et le groupe d'âge, population féminine, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Abstème			B	ABC			AB	ABC			AB	ABC
1 jour	D	D	D		D	CD	D		D	CD	D	
2 ou 3 jours	D	CD	D		D	D	D		D	D		
4 jours ou plus	D	D	D									
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 219 : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool selon le pays, le sexe, la date et le groupe d'âge.

		Estonie				Lettonie			
		Hommes		**Femmes**		**Hommes**		**Femmes**	
		1994	**1999**	**1994**	**1999**	**1994**	**1999**	**1994**	**1999**
18-29 ans	**Abstème**	22.5	27.9	41.0	46.9	24.7	35.5	35.2	48.6
	1 jour	40.3	41.6	45.6	37.1	55.7	42.7	55.7	41.7
	2 ou 3 jours	23.9	22.3	11.2	13.4	14.1	15.5	8.3	7.8
	4 jours et plus	13.4	8.2	2.3	2.6	5.5	6.3	0.8	1.9
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
30-44 ans	**Abstème**	17.4	24.0	36.3	40.9	25.0	29.4	40.8	46.5
	1 jour	40.7	31.5	48.0	38.5	45.4	41.2	52.7	43.6
	2 ou 3 jours	30.8	26.4	13.1	17.5	22.1	22.0	5.7	8.2
	4 jours et plus	11.1	18.0	2.6	3.0	7.5	7.5	0.9	1.7
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
45-59 ans	**Abstème**	23.8	31.1	49.9	49.6	29.9	42.7	58.9	59.6
	1 jour	41.9	28.6	40.1	36.0	47.8	36.9	36.3	34.2
	2 ou 3 jours	24.9	26.4	8.4	11.4	16.5	13.2	4.6	5.3
	4 jours et plus	9.4	13.9	1.6	3.0	5.8	7.2	0.2	0.8
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
60 ans et +	**Abstème**	50.6	48.7	74.9	75.9	51.6	55.2	83.3	84.3
	1 jour	30.1	26.3	20.8	19.4	37.7	33.0	16.2	13.7
	2 ou 3 jours	14.0	13.8	3.2	4.2	9.0	7.1	0.5	1.6
	4 jours et plus	5.3	11.3	1.1	0.5	1.6	4.7	0.0	0.5
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Les cellules grisées indiquent que l'augmentation ou la diminution des proportions entre 1994 et 1999 est statistiquement significative au seuil de 0,05.

		Lituanie			
		Hommes		Femmes	
		1994	1999	1994	1999
18-29 ans	Abstème	22.6	30.9	35.2	53.9
	1 jour	38.2	40.6	46.5	32.8
	2 ou 3 jours	29.5	21.8	15.0	9.4
	4 jours et plus	9.8	6.7	3.4	3.9
		100 %	100 %	100 %	100 %
30-44 ans	Abstème	18.7	25.4	37.0	50.2
	1 jour	35.4	36.9	49.5	36.1
	2 ou 3 jours	29.5	26.2	9.6	9.8
	4 jours et plus	16.5	11.4	3.9	3.8
		100 %	100 %	100 %	100 %
45-59 ans	Abstème	29.8	35.6	59.9	69.0
	1 jour	30.8	27.3	33.4	25.9
	2 ou 3 jours	26.6	23.7	6.0	5.1
	4 jours et plus	12.8	13.5	0.7	0.0
		100 %	100 %	100 %	100 %
60 ans et +	Abstème	49.0	57.3	81.3	87.6
	1 jour	32.7	20.6	16.2	8.9
	2 ou 3 jours	10.3	13.3	1.9	2.5
	4 jours et plus	8.1	8.9	0.6	1.0
		100 %	100 %	100 %	100 %

Les cellules grisées indiquent que l'augmentation ou la diminution des proportions entre 1994 et 1999 est statistiquement significative au seuil de 0,05.

3.1.4. Locus de contrôle → Santé subjective

Tableau 220 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, selon le pays, le sexe et la date.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	1994		1999		1994		1999		1994		1999	
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Totalement externe	19,2	27,1	16,6	20,6	26,5	38,0	24,3	31,7	39,8	48,6	49,0	57,3
Externe	28,9	33,8	24,0	30,6	33,6	37,8	33,2	37,7	33,7	33,8	27,2	27,7
Interne	31,0	26,2	30,4	29,4	32,7	20,2	34,9	24,1	21,8	15,5	21,6	13,1
Totalement interne	20,8	13,0	29,0	19,3	7,2	4,0	7,6	6,4	4,7	2,1	2,3	1,9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre hommes et femmes est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 221A : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, selon le pays, le sexe et la date.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.
Totalement externe	19,2	26,5	39,8	16,6	24,3	49,0	27,1	38,0	48,6	20,6	31,7	57,3
Externe	28,9	33,6	33,7	24,0	33,2	27,2	33,8	37,8	33,8	30,6	37,7	27,7
Interne	31,0	32,7	21,8	30,4	34,9	21,6	26,2	20,2	15,5	29,4	24,1	13,1
Totalement interne	20,8	7,2	4,7	29,0	7,6	2,3	13,0	4,0	2,1	19,3	6,4	1,9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 221B : Comparaison des proportions, locus de contrôle, sexe masculin

	1994			1999		
	Estonie	Lettonie	Lituanie	Estonie	Lettonie	Lituanie
Totalement externe		Est.	Est. – Lett.		Est.	Est. - Lett.
Externe		Est.	Est.		Est. – Lit.	
Interne	Lit.	Lit.		Lit.	Est. – Lit.	
Totalement interne	Lett. – Lit.			Lett. – Lit.	Lit.	

Tableau 221C : Comparaison des proportions, locus de contrôle, sexe féminin

	1994			1999		
	Estonie	Lettonie	Lituanie	Estonie	Lettonie	Lituanie
Totalement externe		Est.	Est. – Lett.		Est.	Est. – Lett.
Externe		Est.			Est. – Lit.	
Interne	Lett. – Lit.	Lit.		Lett. – Lit.	Lit.	
Totalement interne	Lett. – Lit.	Lit.		Lett. – Lit.	Lit.	

Tableau 222 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle et selon l'ethnie, Estonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	Non-Estoniens	Estoniens	Non-Estoniens
Totalement externe	16,3	24,3	24,5	32,0
Externe	25,9	34,2	31,1	38,8
Interne	32,9	27,8	29,2	20,5
Totalement interne	25,0	13,6	15,2	8,7
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 223 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle et selon l'ethnie, Lettonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Totalement externe	22,2	32,4	31,4	46,0
Externe	32,2	35,4	37,6	38,0
Interne	36,1	28,1	25,0	14,3
Totalement interne	9,5	4,1	6,0	1,7
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 224 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle et selon l'ethnie, Lituanie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Totalement externe	38,1	47,6	48,8	47,8
Externe	35,3	26,0	33,0	37,2
Interne	21,7	22,5	15,9	13,6
Totalement interne	4,9	3,9	2,3	1,4
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 225 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle et selon l'ethnie, Estonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniens**	**Non-Estoniens**
Totalement externe	15,1	19,9	19,2	23,5
Externe	23,0	26,1	28,3	35,1
Interne	30,0	31,1	30,0	28,2
Totalement interne	31,9	22,9	22,5	13,1
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 226 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle et selon l'ethnie, Lettonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Totalement externe	22,4	26,9	28,9	35,8
Externe	29,8	37,6	35,9	40,3
Interne	38,5	30,3	27,2	19,6
Totalement interne	9,3	5,2	8,0	4,3
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 227 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle et selon l'ethnie, Lituanie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Totalement externe	50,1	41,2	57,8	54,5
Externe	25,6	38,3	27,6	27,9
Interne	22,1	18,0	12,5	16,5
Totalement interne	2,3	2,5	2,0	1,1
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 228A : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, le sexe, l'année et le groupe économique. **Estonie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Totalement externe	25.7	19.7	10.1	24.3	18.2	13.1	37.2	26.2	15.3	29.0	22.9	14.3
Externe	31.9	31.5	17.0	31.9	26.5	19.7	32.8	34.8	30.4	38.6	34.2	23.0
Interne	25.9	30.1	40.2	24.6	30.5	31.9	22.7	26.5	30.5	24.2	26.3	35.4
Totalement interne	16.5	18.7	32.7	19.3	24.8	35.3	7.3	12.5	23.9	8.3	16.6	27.3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 228B : Comparaison des proportions, locus de contrôle.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Totalement externe	ME	E		E	E		ME	E		E	E	
Externe	E	E		E	E					E	E	
Interne			FM						F			FM
Totalement interne			FM			FM		F	FM		F	FM

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 229A : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, le sexe, l'année et le groupe économique. **Lettonie**.

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

	Hommes						**Femmes**					
	1994			**1999**			**1994**			**1999**		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Totalement externe	31.6	27.4	14.2	34.4	25.4	17.3	41.3	37.2	34.9	42.1	31.9	23.3
Externe	35.4	33.8	29.5	39.5	34.0	28.7	35.8	38.8	37.3	37.9	39.0	35.8
Interne	23.3	32.9	47.8	22.7	34.3	42.6	19.9	19.7	22.7	14.6	23.3	32.7
Totalement interne	9.6	5.9	8.5	3.4	6.3	11.4	3.0	4.3	5.1	5.4	5.8	8.2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 229B : Comparaison des proportions, locus de contrôle.

	Hommes						**Femmes**					
	1994			**1999**			**1994**			**1999**		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Totalement externe	E	E		ME	E					ME	E	
Externe				E								
Interne		F	FM		F	FM					F	FM
Totalement interne						FM						

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 230A : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, le sexe, l'année et le groupe économique. **Lituanie**.

	Hommes						**Femmes**					
	1994			**1999**			**1994**			**1999**		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Totalement externe	49.3	39.6	30.7	69.2	53.8	36.6	52.7	49.0	40.5	68.8	62.3	46.5
Externe	34.8	36.6	31.4	19.3	25.1	32.4	33.6	34.9	35.3	24.5	27.1	30.3
Interne	15.9	19.2	31.4	11.4	19.1	27.4	12.4	13.4	22.5	6.0	9.2	20.4
Totalement interne	0.0	4.7	6.5	0.0	1.9	3.6	1.2	2.8	1.7	0.7	1.4	2.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 230B : Comparaison des proportions, locus de contrôle.

	Hommes						**Femmes**					
	1994			**1999**			**1994**			**1999**		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Totalement externe	E			ME	E					E	E	
Externe						F						
Interne			FM			FM			M			FM
Totalement interne												

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 231A : Distribution de la population masculine selon le type de locus de contrôle, le pays et le groupe d'âge, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Totalement externe	12.7	15.8	21.9	27.8	18.7	25.3	27.6	32.6	31.1	37.4	43.8	49.2
Externe	24.9	24.9	33.6	32.7	30.3	32.6	37.9	32.0	29.4	34.2	33.9	37.9
Interne	32.7	31.9	30.0	29.7	37.9	35.8	29.0	29.6	30.6	22.5	19.9	12.3
Totalement interne	29.7	27.4	14.6	9.9	13.1	6.3	5.5	5.8	8.9	5.9	2.4	0.6
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 231B : Comparaison des proportions selon le type de locus de contrôle et le groupe d'âge, population masculine, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Totalement externe			A	AB				A			A	A
Externe			AB									
Interne									D	D		
Totalement interne	CD	CD			C				CD	D		
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 232A : Distribution de la population féminine selon le type de locus de contrôle, le pays et le groupe d'âge, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Totalement externe	15.5	20.7	28.7	41.7	25.7	33.9	44.0	42.9	32.6	45.7	53.5	61.6
Externe	26.8	32.8	28.9	34.9	39.1	40.6	35.4	36.7	40.4	35.2	32.1	27.7
Interne	36.1	27.5	24.0	19.3	28.4	19.8	17.2	18.8	24.6	15.8	12.7	10.0
Totalement interne	21.5	19.0	8.4	4.1	6.8	5.7	3.4	1.5	2.4	3.3	1.8	0.7
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 232B: Comparaison des proportions selon le type de locus de contrôle et le groupe d'âge, population féminine, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Totalement externe			AB	ABC			AB	A		A	A	AB
Externe			A						D			
Interne	BCD	D			CD				CD			
Totalement interne	CD	CD	D		D	D						
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 233A : Distribution de la population masculine selon le type de locus de contrôle, le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Totalement externe	11.6	11.8	17.3	29.5	16.6	18.0	29.8	37.2	38.1	42.8	56.4	64.8
Externe	18.6	20.3	28.7	30.5	32.3	33.8	32.9	33.9	27.1	32.5	25.0	20.7
Interne	32.8	32.9	29.8	24.2	41.9	38.8	31.6	23.8	31.4	22.9	15.2	14.1
Totalement interne	37.0	35.0	24.2	15.8	9.1	9.4	5.7	5.0	3.4	1.9	3.4	0.5
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 233B : Comparaison des proportions selon le type de locus de contrôle et le groupe d'âge, population masculine, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Totalement externe				ABC			AB	AB			AB	AB
Externe			AB	AB						D		
Interne					D	D			CD			
Totalement interne	CD	CD	D									
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 234A : Distribution de la population féminine selon le type de locus de contrôle, le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Totalement externe	11.6	14.8	23.0	31.1	19.5	30.8	35.4	41.2	48.9	54.8	57.7	67.3
Externe	22.4	26.0	35.4	37.5	34.5	37.7	35.7	39.5	29.8	27.3	30.6	23.7
Interne	35.1	34.2	26.7	24.1	32.6	26.1	24.2	15.3	18.3	16.2	10.1	7.4
Totalement interne	30.9	25.0	15.0	7.4	13.4	5.5	4.7	4.0	3.0	1.7	1.6	1.6
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 234B : Comparaison des proportions selon le type de locus de contrôle et le groupe d'âge, population féminine, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Totalement externe			AB	ABC		A	A	AB				AB
Externe			AB	AB								
Interne	CD	CD			D	D	D		CD	D		
Totalement interne	CD	CD	D		BCD							
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tableau 235 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, selon le pays, le sexe, la date et le groupe d'âge.

		Estonie				Lettonie			
		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
		1994	1999	1994	1999	1994	1999	1994	1999
18-29 ans	**Tot. externe**	12,7	11,6	15,5	11,7	18,7	16,6	25,7	18,8
	Externe	24,9	18,6	26,8	21,2	30,3	32,3	39,1	35,1
	Interne	32,7	32,8	36,1	35,2	37,9	41,9	28,4	33,1
	Tot. interne	29,7	37,0	21,5	32,0	13,1	9,1	6,8	13,0
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
30-44 ans	**Tot. externe**	15,8	11,8	20,7	13,9	25,3	18,0	33,9	29,9
	Externe	24,9	20,3	32,8	25,7	32,6	33,8	40,6	38,0
	Interne	31,9	32,9	27,5	33,6	35,8	38,8	19,8	26,6
	Tot. interne	27,4	35,0	19,0	26,8	6,3	9,4	5,7	5,5
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
45-59 ans	**Tot. externe**	21,9	17,3	28,7	23,2	27,6	29,8	44,0	34,3
	Externe	33,6	28,7	38,9	35,2	37,9	32,9	35,4	36,6
	Interne	30,0	29,8	24,0	26,5	29,0	31,6	17,2	24,2
	Tot. interne	14,6	24,2	8,4	15,5	5,5	5,7	3,4	4,9
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
60 ans et +	**Tot. externe**	27,8	29,5	41,7	31,0	32,6	37,2	42,9	39,9
	Externe	32,7	30,5	34,9	37,7	32,0	33,9	36,7	40,2
	Interne	29,7	24,2	19,3	24,0	29,6	23,8	18,8	15,7
	Tot. interne	9,9	15,8	4,1	7,3	5,8	5,0	1,5	4,2
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Les cellules grisées indiquent que l'augmentation ou la diminution des proportions entre 1994 et 1999 est statistiquement significative au seuil de 0,05.

		Lituanie			
		Hommes		Femmes	
		1994	1999	1994	1999
18-29 ans	**Tot. externe**	31,1	38,1	32,6	48,0
	Externe	29,4	27,1	40,4	29,9
	Interne	30,6	31,4	24,6	19,1
	Tot. interne	8,9	3,4	2,4	3,0
		100 %	100 %	100 %	100 %
30-44 ans	**Tot. externe**	37,4	42,8	45,7	54,9
	Externe	34,2	32,5	35,2	27,2
	Interne	22,5	22,9	15,8	16,4
	Tot. interne	5,9	1,9	3,3	1,5
		100 %	100 %	100 %	100 %
45-59 ans	**Tot. externe**	43,8	56,4	53,5	57,2
	Externe	33,9	25,0	32,1	30,8
	Interne	19,9	15,2	12,7	10,2
	Tot. interne	2,6	3,4	1,8	1,7
		100 %	100 %	100 %	100 %
60 ans et +	**Tot. externe**	49,2	64,8	61,6	67,1
	Externe	37,9	20,7	27,7	23,8
	Interne	12,3	14,1	10,0	7,5
	Tot. interne	0,6	0,5	0,7	1,6
		100 %	100 %	100 %	100 %

Les cellules grisées indiquent que l'augmentation ou la diminution des proportions entre 1994 et 1999 est statistiquement significative au seuil de 0,05.

3.1.5. Une mesure de l'accès au système de soins et de son impact sur la santé subjective

Tableau 236 : Taille des populations totales et des populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin (effectifs non pondérés tels qu'utilisés par Amos) et entre parenthèses proportions de ces sous-populations par rapport aux populations totales, 1999.

	Estonie		**Lettonie**		**Lituanie**	
	Hommes	**Femmes**	**Hommes**	**Femmes**	**Hommes**	**Femmes**
Population totale	1859	2867	1196	1848	1146	1597
Population ayant besoins des deux soins médicaux	610 (32,8 %)	1038 (36,2 %)	363 (30,3 %)	733 (39,7%)	352 (30,7 %)	570 (35,7 %)

Tableau 237 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective, selon le pays et le sexe. Populations ayant besoin de soins de santé et population totale, 1999.

	Estonie				**Lettonie**				**Lituanie**			
	Hommes		**Femmes**		**Hommes**		**Femmes**		**Hommes**		**Femmes**	
	SDM	**Tous**	**SDM**	**Tous**	**SDM**	**Tous**	**SDM**	**Tous**	**SDM**	**Tous**	**SDM**	**Tous**
Bonne	32.2	36.9	25.3	29.3	20.6	32.4	13.2	21.8	35.7	43.3	21.0	26.2
Moyenne	47.7	49.8	50.2	51.7	49.1	49.5	47.6	48.1	51.2	45.9	56.2	54.4
Mauvaise	20.1	13.3	24.5	19.0	30.2	18.1	39.1	30.1	13.0	10.8	22.7	19.5
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SDM : Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 238 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique, selon le pays et le sexe. Populations ayant besoin de soins de santé et population totale, 1999.

	Estonie				**Lettonie**				**Lituanie**			
	Hommes		**Femmes**		**Hommes**		**Femmes**		**Hommes**		**Femmes**	
	SDM	**Tous**	**SDM**	**Tous**	**SDM**	**Tous**	**SDM**	**Tous**	**SDM**	**Tous**	**SDM**	**Tous**
Bonne	43.4	50.4	29.7	32.8	40.7	50.7	22.3	30.5	53.1	61.1	29.2	35.7
Moyenne	39.3	36.7	44.9	44.8	35.8	33.3	36.8	38.0	33.3	29.6	41.0	41.2
Mauvaise	17.3	13.0	25.4	22.4	23.4	16.0	40.9	31.4	13.7	9.3	29.9	23.0
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SDM : Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 239 : Distribution de la population selon l'état de santé physique, selon le pays et le sexe. Populations ayant besoin de soins de santé et population totale, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous
Aucune maladie	61.4	68.4	54.4	60.4	58.7	73.6	61.5	70.1	82.9	87.8	75.5	81.3
Maladie avec de légères limitations	30.4	24.9	33.4	28.8	27.9	18.6	23.6	18.3	11.0	7.2	11.7	9.4
Maladies avec de sévères limitations	8.1	6.7	12.2	10.8	13.4	7.8	14.9	11.6	6.1	5.0	12.7	9.3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SDM : Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 240 : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines), selon le pays et le sexe. Populations ayant besoin de soins de santé et population totale, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous
Abstème	31.1	31.8	57.1	54.6	40.9	39.3	65.9	62.0	38.0	35.6	64.9	65.9
1 jour	32.6	32.2	30.3	31.9	39.0	38.8	28.0	31.5	30.1	32.3	26.8	25.3
2 ou 3 jours	21.3	22.8	10.6	11.3	13.6	15.3	5.4	5.4	21.7	21.9	6.3	6.6
4 jours ou plus	14.9	13.3	2.0	2.2	6.5	6.6	0.6	1.1	10.2	10.2	2.0	2.2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SDM : Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 241 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, selon le pays et le sexe. Populations ayant besoin de soins de santé et population totale, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous	SDM	Tous
Totalement externe	15.7	16.6	21.6	20.6	24.5	24.3	35.2	31.7	48.2	49.0	57.4	57.3
Externe	24.7	24.0	33.9	30.6	37.0	33.2	36.3	37.7	28.3	27.2	27.5	27.7
Interne	32.4	30.4	27.2	29.4	30.2	34.9	22.0	24.1	21.8	21.6	13.2	13.1
Totalement interne	27.2	29.0	17.3	19.3	8.3	7.6	6.5	6.4	1.7	2.3	1.9	1.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SDM : Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 242A : Distribution de la population selon la santé subjective, selon le pays, le sexe. Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin, 1999.

	Hommes			Femmes		
	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.
Bonne	32.2	20.6	35.7	25.3	13.2	21.0
Moyenne	47.7	49.1	51.2	50.2	47.6	56.2
Mauvaise	20.1	30.2	13.0	24.5	39.1	22.7
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 242B : Comparaison des proportions, santé subjective.

	Hommes			Femmes		
	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.
Bonne	Lett.		Lett.	Lett.		Lett.
Moyenne						Lett.
Mauvaise	Lit.	Est.-Lit.			Est.-Lit.	

Tableau 243A : Distribution de la population selon la santé psychologique, selon le pays, le sexe. Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin, 1999.

	Hommes			Femmes		
	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.
Bonne	43.4	40.7	53.1	29.7	22.3	29.2
Moyenne	39.3	35.8	33.3	44.9	36.8	41.0
Mauvaise	17.3	23.4	13.7	25.4	40.9	29.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 243B : Comparaison des proportions, santé psychologique.

	Hommes			Femmes		
	Est.	**Lett.**	**Lit.**	**Est.**	**Lett.**	**Lit.**
Bonne			Est.- Lett.	Lett.		Lett.
Moyenne				Lett.		
Mauvaise		Lit.			Est.- Lit.	

Tableau 244A : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (nombre de jours au cours des deux dernières semaines), selon le pays, le sexe. Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin, 1999.

	Hommes			Femmes		
	Est.	**Lett.**	**Lit.**	**Est.**	**Lett.**	**Lit.**
Abstème	31.1	40.9	38.0	57.1	65.9	64.9
1 jour	32.6	39.0	30.1	30.3	28.0	26.8
2 ou 3 jours	21.3	13.6	21.7	10.6	5.4	6.3
4 jours ou plus	14.9	6.5	10.2	2.0	0.6	2.0
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 244B : Comparaison des proportions, fréquence de consommation d'alcool.

	Hommes			Femmes		
	Est.	**Lett.**	**Lit.**	**Est.**	**Lett.**	**Lit.**
Abstème		Est.			Est.	Est.
1 jour		Lit.				
2 ou 3 jours	Lett.		Lett.	Lett.-Lit.		
4 jours ou plus	Lett.					

Tableau 245A : Distribution de la population selon l'état de santé physique, selon le pays, le sexe. Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin, 1999.

	Hommes			Femmes		
	Est.	**Lett.**	**Lit.**	**Est.**	**Lett.**	**Lit.**
Aucune maladie	61.4	58.7	82.9	54.4	61.5	75.5
Maladie avec de légères limitations	30.4	27.9	11.0	33.4	23.6	11.7
Maladies avec de sévères limitations	8.1	13.4	6.1	12.2	14.9	12.7
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 245B : Comparaison des proportions, santé physique.

	Hommes			Femmes		
	Est.	**Lett.**	**Lit.**	**Est.**	**Lett.**	**Lit.**
Aucune maladie			Est.-Lett.		Est.	Est.-Lett.
Maladie avec de légères limitations	Lit.	Lit.		Lett.-Lit.	Lit.	
Maladies avec de sévères limitations		Est.-Lit.				

Tableau 246A : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, selon le pays, le sexe. Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin, 1999.

	Hommes			Femmes		
	Est.	**Lett.**	**Lit.**	**Est.**	**Lett.**	**Lit.**
Totalement externe	15.7	24.5	48.2	21.6	35.2	57.4
Externe	24.7	37.0	28.3	33.9	36.3	27.5
Interne	32.4	30.2	21.8	27.2	22.0	13.2
Totalement interne	27.2	8.3	1.7	17.3	6.5	1.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 246B : Comparaison des proportions, locus de contrôle.

	Hommes			Femmes		
	Estonie	**Lettonie**	**Lituanie**	**Estonie**	**Lettonie**	**Lituanie**
Totalement externe		Est.	Est.- Lett.		Est.	Est.- Lett.
Externe		Est.-Lit.			Lit.	
Interne	Lit.	Lit.		Lit.	Lit.	
Totalement interne	Lett.-Lit.	Lit.		Lett.-Lit.	Lit.	

Tableau 248A : Distribution de la population selon la satisfaction des besoins de santé, selon le pays, le sexe. Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin, 1999.

	Hommes			Femmes		
	Est.	**Lett.**	**Lit.**	**Est.**	**Lett.**	**Lit.**
2 besoins satisfaits	76.0	43.3	63.0	72.5	38.3	53.0
1 des 2 besoins satisfaits	11.2	20.2	16.8	12.0	18.2	21.1
Aucun besoin satisfait	12.9	36.5	20.2	15.6	43.5	25.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 248B : Comparaison des proportions, besoins de santé.

	Hommes			**Femmes**		
	Est.	**Lett.**	**Lit.**	**Est.**	**Lett.**	**Lit.**
2 besoins satisfaits	Lett.-Lit.		Lett.	Lett.-Lit.		Lett.
1 des 2 besoins satisfaits		Est.	Est.		Est.	Est.
Aucun besoin satisfait		Est.-Lit.	Est.		Est.-Lit.	Est.

Tableau 249 : Ajustement des modèles (Posterior predictive p-values). Testés sur les populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin

Estonie		**Lettonie**		**Lituanie**	
Hommes	**Femmes**	**Hommes**	**Femmes**	**Hommes**	**Femmes**
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51

Tableau 250 : Coefficients de régression. Population masculine totale et seules populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin (SDM), Estonie, Lettonie et Lituanie, 1999.

	Estonie		**Lettonie**		**Lituanie**	
	Tous	**SDM**	**Tous**	**SDM**	**Tous**	**SDM**
Santé psychologique → Santé subjective	0,156	0,203	0,192	0,134	0,222	0,219
Instruction → Locus de contrôle	0,520^{AB}	0,437	0,377^{A}	0,424	0,329^{B}	0,240
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,027	-0,050	-0,056	-0,140	-0,072	-0,072
Santé physique → Santé psychologique	0,308	0,383	0,311	0,310	0,356	0,320
Santé physique → Santé subjective	0,524^{A}	0,451	0,455^{A}	0,390^{a}	0,499	0,581^{a}
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,102	-0,133	-0,105	-0,121	-0,091	-0,027
Consommation d'alcool->Santé subjective	-0,039	-0,050	-0,054	-0,079	-0,068	-0,108
Instruction → Consommation d'alcool	0,087	0,107	0,050	0,032	0,127	0,078
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,054	-0,036	-0,013	0,004	-0,018	-0,072
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,186	-0,103	-0,164	-0,165	-0,215	-0,160
Soutien social →Santé psychologique	0,029	-0,002	-0,008	0,053	0,016	0,029
Accès aux soins→ Santé subjective		0,082		0,072		0,043
Santé physique ↔ Instruction	-0,057	-0,102	-0,076	-0,106	-0,070	-0,085
Santé physique ↔ Soutien social	0,020	0,034	**0,018**	0,000	0,028	0,013
Soutien social ↔ Instruction	0,002	0,000	**-0,024**	0,008	**-0,023**	0,026
Accès aux soins ↔ Santé physique		0,040^{a}		0,161^{a}		0,058
Accès aux soins ↔ Soutien social		0,057		0,049		0,009
Accès aux soins ↔ Instruction		-0,034^{a}		-0,167^{ab}		-0,015^{b}

SDM : Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin
Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
Aucun paramètres n'est significativement différent entre les deux population au sein d'un même pays au seuil de 0,05.
a, b, c indiquent des paramètres significativement différents entre populations ayant besoin de soins de deux pays au seuil de 0,05.
A, B, C indiquent des paramètres significativement différents entre populations totales de deux pays au seuil de 0,05.

Tableau 251 : Coefficients de régression. Population féminine totale et seule populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin (SDM), Estonie, Lettonie et Lituanie, 1999.

	Estonie		**Lettonie**		**Lituanie**	
	Tous	**SDM**	**Tous**	**SDM**	**Tous**	**SDM**
Santé psychologique → Santé subjective	0,159^{AB}	0,157	0,217^{A}	0,166	0,231^{B}	0,195
Instruction → Locus de contrôle	0,456^{AB}	0,379^{a}	0,304^{A}	0,286	0,299^{B}	0,202^{a}
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,083	-0,104	-0,080	-0,088	-0,077	-0,094
Santé physique → Santé psychologique	0,245	0,298	0,274	0,253	0,296	0,254
Santé physique → Santé subjective	0,495^{AB}	0,475^{a}	0,355^{A}	0,317^{a}	0,386^{B}	0,427
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,109	-0,118	-0,095	-0,056	-0,118	**-0,055**
Consommation d'alcool->Santé subjective	-0,094^{A}	-0,093	-0,181^{A}	-0,148	-0,157	-0,156
Instruction → Consommation d'alcool	0,201	0,186	0,162	0,169	0,193	0,148
Santé psychologique → Consommation d'alcool	-0,014	-0,035	0,008	-0,023	**-0,030**	-0,053
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,127	-0,119	-0,141	-0,120	-0,087	-0,055
Soutien social →Santé psychologique	0,035^{A}	0,032	0,172^{A}	0,171	0,091	0,069
Accès aux soins→ Santé subjective		0,090		0,078		0,033
Santé physique ↔ Instruction	-0,102	-0,080	-0,102	-0,080	-0,086	-0,122
Santé physique ↔ Soutien social	0,037	0,035	0,051	0,045	0,031	0,042
Soutien social ↔ Instruction	-0,049	-0,048	-0,045	-0,057	-0,039	-0,013
Accès aux soins ↔ Santé physique		0,064		0,122		0,105
Accès aux soins ↔ Soutien social		0,050		0,071		0,053
Accès aux soins ↔ Instruction		-0,028		-0,093		0,018

SDM : Populations ayant à la fois besoin de soins dentaires et d'une consultation avec un bon médecin
Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
Aucun paramètres n'est significativement différent entre les deux population au sein d'un même pays au seuil de 0,05.
a, b, c indiquent des paramètres significativement différents entre populations ayant besoin de soins de deux pays au seuil de 0,05.
A, B, C indiquent des paramètres significativement différents entre populations totales de deux pays au seuil de 0,05.

Tableau 252 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction, selon le pays, le sexe et la date.

	Estonie				**Lettonie**				**Lituanie**			
	1994		**1999**		**1994**		**1999**		**1994**		**1999**	
	H	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**	**H**	**F**
Primaire ou inférieur	32,2	27,6	31,2	27,5	33,8	34,2			32,6	34,5		
Secondaire	52,9	56,6	54,1	56,5	50,2	49,8			54,0	49,9		
Supérieur	14,9	15,8	14,7	16,0	16,0	15,9			13,4	15,6		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre hommes et femmes est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 253A : Distribution de la population selon le niveau d'instruction, selon le pays, le sexe et la date.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.	Est.	Lett.	Lit.
Primaire ou inférieur	32,2	33,8	32,6	29,1	35,2	33,1	27,6	34,2	34,5	26,6	31,1	34,0
Secondaire	52,9	50,2	54,0	43,4	41,1	38,2	56,6	49,8	49,9	39,5	37,0	34,4
Supérieur	14,9	16,0	13,4	27,4	23,7	28,7	15,8	15,9	15,6	33,9	32,0	31,6
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 253B : Comparaison des proportions, niveau d'instruction, sexe masculin.

	1994			1999		
	Estonie	**Lettonie**	**Lituanie**	**Estonie**	**Lettonie**	**Lituanie**
Primaire ou inférieur					Est.	
Secondaire				Lit.		
Supérieur						Lett.

Tableau 253C : Comparaison des proportions, niveau d'instruction, sexe féminin

	1994			1999		
	Estonie	**Lettonie**	**Lituanie**	**Estonie**	**Lettonie**	**Lituanie**
Primaire ou inférieur		Est.	Est.		Est.	Est.
Secondaire	Lett. – Lit.			Lit.		
Supérieur						

Tableau 254 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction et selon l'ethnie, Estonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniens**	**Non-Estoniens**
Primaire ou inférieur	34,9	27,6	27,7	27,4
Secondaire	49,9	58,2	57,7	54,3
Supérieur	15,3	14,3	14,6	18,3
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 255 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction et selon l'ethnie, Lettonie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Primaire ou inférieur	36,8	29,7	36,4	31,6
Secondaire	49,1	51,6	47,8	52,4
Supérieur	14,1	18,7	15,9	16,0
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 256 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction et selon l'ethnie, Lituanie, 1994.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Primaire ou inférieur	33,9	26,1	35,1	32,1
Secondaire	51,8	64,7	48,7	54,9
Supérieur	14,3	9,2	16,2	12,9
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 257 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction et selon l'ethnie, Estonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniens**	**Non-Estoniens**
Primaire ou inférieur	33,2	21,0	27,9	24,3
Secondaire	42,2	45,8	40,2	38,1
Supérieur	24,5	33,2	31,9	37,6
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 258 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction et selon l'ethnie, Lettonie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Lettons	**Non-Lettons**	**Lettons**	**Non-Lettons**
Primaire ou inférieur	38,4	31,1	30,5	31,8
Secondaire	40,1	42,4	37,7	35,9
Supérieur	21,5	26,5	31,8	32,3
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 259 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction et selon l'ethnie, Lituanie, 1999.

	Hommes		Femmes	
	Lituaniens	**Non-Lituaniens**	**Lituaniens**	**Non-Lituaniens**
Primaire ou inférieur	33,8	29,4	35,1	28,2
Secondaire	38,5	36,9	33,1	41,6
Supérieur	27,7	33,6	31,8	30,2
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre ethnies est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 260A : Distribution de la population selon le niveau d'instruction, le sexe, l'année et le groupe économique. **Estonie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Primaire ou inférieur	56.0	30.1	10.2	56.7	35.1	15.3	51.4	23.6	6.3	59.4	29.1	9.6
Secondaire	38.0	55.7	61.6	30.8	44.3	47.0	40.8	59.7	68.3	27.6	41.8	41.8
Supérieur	5.9	14.3	28.2	12.5	20.6	37.6	7.8	16.7	25.4	13.0	29.1	48.6
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 260B : Comparaison des proportions, niveau d'instruction.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Primaire ou inférieur	ME	E		ME	E		ME	E		ME	E	
Secondaire		F	F		F	F		F	FM		F	F
Supérieur		F	FM		F	FM		F	FM		F	FM

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 261A : Distribution de la population selon le niveau d'instruction, le sexe, l'année et le groupe économique. **Lettonie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**	**F**	**M**	**E**
Primaire ou inférieur	57.4	30.1	5.9	60.5	38.2	17.1	59.2	26.4	9.7	51.8	32.7	11.4
Secondaire	37.1	54.2	57.6	30.2	41.6	47.0	33.2	56.0	60.8	34.5	38.3	37.0
Supérieur	5.5	15.8	36.5	9.3	20.2	35.9	7.6	17.6	29.5	13.6	29.0	51.7
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 261B : Comparaison des proportions, niveau d'instruction.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Primaire ou inférieur	ME	E		ME	E		ME	E		ME	E	
Secondaire		F	F		F	F		F	F			
Supérieur		F	FM		F	FM		F	FM		F	FM

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 262A : Distribution de la population selon le niveau d'instruction, le sexe, l'année et le groupe économique. **Lituanie**.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Primaire ou inférieur	43.2	31.3	11.0	62.3	36.3	17.7	47.8	29.3	12.0	64.2	33.1	15.7
Secondaire	51.1	56.9	61.1	27.8	40.6	41.3	41.7	55.1	59.7	26.5	38.5	35.2
Supérieur	5.6	11.8	27.9	9.9	23.1	41.0	10.5	15.6	28.4	9.3	28.4	49.1
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 262B : Comparaison des proportions, niveau d'instruction.

	Hommes						Femmes					
	1994			1999			1994			1999		
	F	M	E	F	M	E	F	M	E	F	M	E
Primaire ou inférieur	E	E		ME	E		ME	E		ME	E	
Secondaire					F	F		F	F		F	F
Supérieur			FM		F	FM			FM		F	FM

F : niveau économique faible, M : moyen et E : élevé.

Tableau 263A : Distribution de la population masculine selon le niveau d'instruction, le pays et le groupe d'âge, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus	18-29	30-44	45-59	60 et plus
Primaire ou inférieur	19.1	16.2	43.4	55.2	15.8	16.4	41.9	59.8	12.5	9.8	40.8	80.8
Secondaire	70.9	64.0	42.0	31.5	70.1	65.0	42.7	25.0	74.0	74.9	39.2	15.5
Supérieur	10.0	19.9	14.5	13.3	14.1	18.6	15.4	15.2	13.5	15.3	20.0	3.6
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 263B : Comparaison des proportions selon le niveau d'instruction et le groupe d'âge, population masculine, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Primaire ou inférieur			AB	ABC			AB	ABC			AB	ABC
Secondaire	CD	CD	D		CD	CD	D		CD	CD	D	
Supérieur		AD							D	D	D	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 264A : Distribution de la population féminine selon le niveau d'instruction, le pays et le groupe d'âge, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Primaire ou inférieur	11.0	9.8	27.9	58.9	9.5	9.9	31.8	66.8	10.1	3.7	41.2	78.0
Secondaire	73.8	68.0	54.7	33.2	73.0	66.0	52.2	24.4	73.4	71.8	44.7	14.8
Supérieur	15.2	22.1	17.4	7.8	17.5	24.1	16.0	8.8	16.5	24.6	14.1	7.2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 264B : Comparaison des proportions selon le niveau d'instruction et le groupe d'âge, population féminine, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Primaire ou inférieur			AB	ABC			AB	ABC	B		AB	ABC
Secondaire	CD	CD	D		CD	CD	D		CD	CD	D	
Supérieur	D	AD	D		D	CD	D		D	CD	D	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 265A : Distribution de la population masculine selon le niveau d'instruction, le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Primaire ou inférieur	30.5	10.9	32.3	50.0	36.2	16.0	38.7	57.9	29.8	10.7	32.2	69.8
Secondaire	62.0	71.2	49.1	35.5	58.2	67.0	43.1	25.9	61.5	71.0	55.4	20.5
Supérieur	7.5	17.9	18.7	14.6	5.6	17.0	18.2	16.2	8.7	18.2	12.4	9.7
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 265B : Comparaison des proportions selon le niveau d'instruction et le groupe d'âge, population masculine, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Primaire ou inférieur	B		B	ABC	B		B	ABC	B		B	ABC
Secondaire	CD	ACD	D		CD	CD	D		D	ACD	D	
Supérieur		A	A	A		A	A	A		AD		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 266A : Distribution de la population féminine selon le niveau d'instruction, le pays et le groupe d'âge, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Primaire ou inférieur	15.6	6.0	18.6	57.7	27.1	9.2	19.5	56.7	21.6	7.7	25.5	68.7
Secondaire	74.6	70.4	60.5	33.5	57.9	68.3	62.7	34.0	64.4	67.6	55.2	20.6
Supérieur	9.7	23.6	21.0	8.8	15.0	22.5	17.8	9.2	14.1	24.7	19.3	10.7
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 266B : Comparaison des proportions selon le niveau d'instruction et le groupe d'âge, population féminine, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Primaire ou inférieur	B		B	ABC	B		B	ABC	B		B	ABC
Secondaire	CD	CD	D		D	AD	D		D	CD	D	
Supérieur		AD	AD			D	D			AD	D	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.3. Confirmation des résultats avec l'Estonian Health Interview Survey

Différences entre hommes et femmes

Tableau 267 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective et le sexe.

	Hommes	Femmes
Bonne	40.1	33.7
Moyenne	48.3	50.0
Mauvaise	11.6	16.3
	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 268 : Distribution de la population selon l'état de santé physique et le sexe.

	Hommes	Femmes
Bonne	35.2	24.3
Moyenne	50.4	57.1
Mauvaise	14.3	18.7
	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 269 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique et le sexe.

	Hommes	Femmes
Bonne	76.2	61.3
Moyenne	17.3	22.7
Mauvaise	6.5	16.1
	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 270 : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (au cours des quatre dernières semaines) et le sexe.

	Hommes	Femmes
Abstèmes	35.8	62.1
1 à 3 fois par mois	40.8	31.6
1 à 2 fois par semaine	17.5	5.7
3 fois par semaine ou plus	6.0	0.6
	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 271 : Distribution de la population selon la satisfaction à l'égard du soutien social et le sexe.

	Hommes	Femmes
Très satisfait	57.1	53.2
Plutôt satisfait	27.6	29.6
Plutôt insatisfait	11.6	11.9
Très insatisfait	3.8	5.3
	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 272 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle et le sexe.

	Hommes	Femmes
Totalement externe	10.5	15.3
Externe	22.4	26.8
Interne	34.0	33.5
Totalement interne	33.0	24.3
	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 273 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction et le sexe.

	Hommes	Femmes
Primaire ou inférieur	35.1	34.7
Secondaire	51.3	52.3
Supérieur	13.6	13.0
	100%	100%

Différences entre Estoniens et non-Estoniens

Tableau 274 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective et le sexe.

	Hommes		**Femmes**	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniennes**	**Non-Estoniennes**
Bonne	42.3	35.7	36.9	27.3
Moyenne	45.9	53.0	47.7	54.7
Mauvaise	11.7	11.3	15.4	18.0
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 275 : Distribution de la population selon l'état de santé physique et le sexe.

	Hommes		**Femmes**	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniennes**	**Non-Estoniennes**
Bonne	34.1	37.4	24.4	24.0.
Moyenne	50.4	50.4	55.9	59.3
Mauvaise	15.5	12.2	19.7	16.6
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 276 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique et le sexe.

	Hommes		**Femmes**	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniennes**	**Non-Estoniennes**
Bonne	78.5	71.8	24.4	24.0
Moyenne	16.2	19.4	55.9	59.3
Mauvaise	5.3	8.7	19.7	16.6
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 277 : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (au cours des quatre dernières semaines) et le sexe.

	Hommes		**Femmes**	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniennes**	**Non-Estoniennes**
Abstèmes	36.3	34.9	61.9	62.4
1 à 3 fois par mois	38.2	45.6	31.5	31.7
1 à 2 fois par semaine	17.9	16.6	6.1	4.9
3 fois par semaine ou plus	7.6	2.9	0.5	1.0
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 278 : Distribution de la population selon la satisfaction à l'égard du soutien social et le sexe.

	Hommes		**Femmes**	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniennes**	**Non-Estoniennes**
Très satisfait	54.2	62.8	54.6	52.5
Plutôt satisfait	30.4	21.9	23.4	32.7
Plutôt insatisfait	11.5	11.6	13.8	11.0
Très insatisfait	3.9	3.6	8.2	3.9
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 279 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle et le sexe.

	Hommes		**Femmes**	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniennes**	**Non-Estoniennes**
Totalement externe	10.4	10.6	14.7	16.5
Externe	21.3	24.6	25.0	30.4
Interne	33.2	35.7	33.1	34.3
Totalement interne	35.1	29.1	27.1	18.7
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 280 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction et le sexe.

	Hommes		**Femmes**	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniennes**	**Non-Estoniennes**
Primaire ou inférieur	38.1	29.3	36.9	30.4
Secondaire	47.4	58.8	49.2	58.6
Supérieur	14.5	11.9	13.9	11.0
	100%	100%	100%	100%

Différences entre groupes économiques

Tableau 281A : Distribution de la population selon l'état de santé subjective, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Bonne	41.5	33.8	41.5	51.0	37.1	27.9	33.3	56.3
Moyenne	47.2	50.1	48.3	44.9	45.6	50.9	52.4	40.2
Mauvaise	11.4	16.0	10.3	4.0	17.3	21.2	14.3	3.5
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 281B : Comparaison des proportions selon l'état de santé subjective, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Bonne			B	BC	B			ABC
Moyenne						D	D	
Mauvaise	D	CD	D		D	CD	D	

Tableau 282A : Distribution de la population selon l'état de santé physique, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Bonne	39.6	31.8	34.8	41.1	31.6	22.1	22.8	32.5
Moyenne	44.5	48.1	53.9	50.4	50.2	54.7	59.9	61.5
Mauvaise	15.9	20.0	11.3	8.5	18.1	23.3	17.3	6.1
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 282B : Comparaison des proportions selon l'état de santé physique, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Bonne				B	BC			BC
Moyenne							A	
Mauvaise		CD			D	CD	D	

Tableau 283A : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Bonne	73.9	73.5	78.5	77.3	60.2	57.5	62.3	73.4
Moyenne	18.8	17.0	16.4	20.6	20.3	22.6	24.2	19.2
Mauvaise	7.4	9.4	5.1	2.0	19.5	19.9	13.5	7.4
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 283B : Comparaison des proportions selon l'état de santé psychologique, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Bonne								ABC
Moyenne								
Mauvaise	D	CD			D	CD		

Tableau 284A : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (au cours des quatre dernières semaines), le groupe et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Abstèmes	32.8	41.4	35.7	23.0	57.8	70.4	59.5	42.0
1 à 3 fois par mois	39.3	38.5	41.7	42.7	38.0	25.3	33.3	45.0
1 à 2 fois par semaine	19.1	15.3	16.8	25.4	3.4	3.8	6.5	12.1
3 fois par semaine ou plus	8.7	4.7	5.8	8.9	0.8	0.5	0.7	0.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 284B : Comparaison des proportions selon la fréquence de consommation d'alcool, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Abstèmes		D	D		D	ACD	D	
1 à 3 fois par mois					B		B	BC
1 à 2 fois par semaine				BC			B	ABC
3 fois par semaine ou plus								

Tableau 285A : Distribution de la population selon la satisfaction à l'égard du soutien social, le groupe et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Très satisfait	47.5	55.9	60.3	56.7	47.5	49.8	56.3	60.3
Plutôt satisfait	23.2	25.8	28.1	34.0	22.5	31.3	29.3	30.1
Plutôt insatisfait	20.9	14.5	8.1	7.3	18.6	12.8	10.5	7.9
Très insatisfait	8.5	3.8	3.5	2.0	11.4	6.0	3.9	1.7
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 285B : Comparaison des proportions selon le soutien social, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Très satisfait			A				B	AB
Plutôt satisfait						A		
Plutôt insatisfait	CD	CD			CD			
Très insatisfait	CD				BCD			

Tableau 286A : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Totalement externe	13.6	13.8	9.0	4.9	19.5	17.8	13.7	8.3
Externe	30.1	24.4	21.1	16.3	32.6	29.3	25.0	17.1
Interne	34.7	33.6	34.9	31.0	30.9	33.5	35.0	30.7
Totalement interne	21.6	28.2	35.0	47.8	16.9	19.4	26.3	43.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 286B : Comparaison des proportions selon le type de locus de contrôle, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				Femmes			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Totalement externe	D	CD			D	D		
Externe	D				D	D		
Interne								
Totalement interne			AB	ABC			AB	ABC

Tableau 287A : Distribution de la population selon le niveau d'instruction, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				Femmes			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Primaire ou inférieur	44.5	43.0	32.2	18.5	34.2	43.9	32.2	8.2
Secondaire	48.9	51.3	51.8	50.0	59.5	49.3	52.3	57.1
Supérieur	6.6	5.7	16.0	31.5	6.3	6.8	15.6	34.6
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 287B : Comparaison des proportions selon le niveau d'instruction, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				Femmes			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Primaire ou inférieur	CD	CD	D		D	ACD	D	
Secondaire								
Supérieur			AB	ABC			AB	ABC

Différences entre groupes d'âges

Tableau 288A : Distribution de la population selon l'état de santé subjective, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				Femmes			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Bonne	74.9	50.6	29.3	17.2	70.3	48.6	29.8	13.0
Moyenne	23.9	46.3	60.3	56.8	27.2	47.3	57.2	57.0
Mauvaise	1.3	3.2	10.5	26.0	2.5	4.2	13.0	29.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 1289B : Comparaison des proportions selon l'état de santé subjective, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Bonne	BCD	CD	D		BCD	CD	D	
Moyenne		A	AB	AB		A	AB	AB
Mauvaise			AB	ABC			AB	ABC

Tableau 290A : Distribution de la population selon l'état de santé physique et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Bonne	57.4	46.9	28.0	16.9	47.3	34.7	19.6	11.8
Moyenne	38.6	46.2	57.9	55.9	47.5	56.1	64.0	57.9
Mauvaise	4.0	6.9	14.1	27.2	5.1	9.2	16.3	30.3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 290B : Comparaison des proportions selon l'état de santé physique, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Bonne	BCD	CD	D		BCD	CD	D	
Moyenne			AB	AB			A	A
Mauvaise			AB	ABC			AB	ABC

Tableau 291A : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Bonne	81.9	78.7	76.2	70.6	74.3	66.6	63.2	52.1
Moyenne	15.9	15.7	17.9	19.1	17.4	21.5	22.4	25.6
Mauvaise	2.3	5.6	5.9	10.3	8.3	11.9	14.4	22.3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 291B : Comparaison des proportions selon l'état de santé psychologique, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Bonne	D	D			CD	D	D	
Moyenne								A
Mauvaise				AB			A	ABC

Tableau 292A : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool (au cours des quatre dernières semaines) et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Abstèmes	28.8	24.3	26.4	56.5	47.1	44.0	53.1	82.2
1 à 3 fois par mois	45.6	45.8	46.1	29.7	44.9	44.7	39.3	15.4
1 à 2 fois par semaine	20.3	22.6	19.0	10.2	7.4	10.6	6.4	2.0
3 fois par semaine ou plus	5.3	7.2	8.4	3.6	0.7	0.7	1.2	0.3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 292B : Comparaison des proportions selon la fréquence de consommation d'alcool, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Abstèmes				ABC			B	ABC
1 à 3 fois par mois	D	D	D		D	D	D	
1 à 2 fois par semaine	D	D	D		D	D	D	
3 fois par semaine ou plus		D	D					

Tableau 293A : Distribution de la population selon la satisfaction à l'égard du soutien social et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Très satisfait	59.5	53.0	57.2	58.9	60.8	53.1	52.5	50.5
Plutôt satisfait	29.1	29.7	26.2	25.8	27.0	29.0	30.9	30.3
Plutôt insatisfait	9.3	11.9	13.3	11.4	9.3	12.5	10.9	13.1
Très insatisfait	2.0	5.4	3.3	3.9	2.9	5.4	5.6	6.1
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 293B : Comparaison des proportions selon le soutien social, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Très satisfait					D			
Plutôt satisfait								
Plutôt insatisfait								
Très insatisfait								

Tableau 294A : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Totalement externe	5.1	7.1	11.0	16.5	5.9	10.0	12.3	23.6
Externe	20.5	17.5	21.5	28.6	17.4	21.6	29.6	32.1
Interne	36.9	38.5	34.9	27.8	37.0	37.7	37.0	28.1
Totalement interne	37.6	36.8	32.7	27.2	39.7	30.8	21.1	16.2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 294B : Comparaison des proportions selon le type de locus de contrôle, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Totalement externe			A	AB			A	ABC
Externe				ABC			AB	AB
Interne	D	D			D	D	D	
Totalement interne	D	D			BCD	CD		

Tableau 295A : Distribution de la population selon le niveau d'instruction et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Primaire ou inférieur	24.1	12.6	34.7	61.0	13.2	5.2	23.2	64.9
Secondaire	72.4	71.2	47.1	24.5	76.2	74.6	58.8	27.6
Supérieur	3.5	16.1	18.2	14.4	10.5	20.2	18.1	7.5
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 295B : Comparaison des proportions selon le niveau d'instruction, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Primaire ou inférieur	B		AB	ABC	B		AB	ABC
Secondaire	CD	CD	D		CD	CD	D	
Supérieur		A	A	A		AD	AD	

Tableau 296 : Taille des populations et qualité d'ajustement des modèles (Posterior predictive p-values).

	Hommes		**Femmes**	
	N	ppp	N	ppp
Tous âges	2044	0.50	2509	0.49
18-29	399	0.49	408	0.56
30-44	539	0.49	556	0.49
45-59	462	0.50	514	0.48
60+	644	0.51	1031	0.50
Estoniens	1347	0.50	1673	0.50
Non-Estoniens	697	0.50	839	0.49
Revenus très faibles	183	0.50	237	0.50
Revenus faibles	719	0.50	997	0.50
Revenus élevés	861	0.49	1022	0.49
Revenus très élevés	248	0.50	231	0.49

Tableau 297 : Coefficients de régression. Hommes et femmes, Estonie, 1996.

	Hommes	**Femmes**
Santé psychologique → Santé subjective	0,179	0,185
Instruction → Locus de contrôle	0,381	0,403
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,088*	-0,152*
Santé physique → Santé psychologique	0,212*	0,340*
Santé physique → Santé subjective	0,425	0,390
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,095	-0,087
Consommation d'alcool → Santé subjective	-0,070*	-0,156*
Instruction → Consommation d'alcool	0,140*	0,238*
Santé psychologique → Consommation d'alcool	**0,055**	0,019
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,116	-0,099
Soutien social → Santé psychologique	0,119	0,135
Santé physique ↔ Instruction	-0,086	-0,084
Santé physique ↔ Soutien social	0,036	0,067
Soutien social ↔ Instruction	-0,032	-0,035

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre hommes et femmes.

Tableau 298 : Coefficients de régression selon l'origine ethnique. Hommes et femmes, Estonie, 1996.

	Hommes		**Femmes**	
	Estoniens	**Non-Estoniens**	**Estoniens**	**Non-Estoniens**
Santé psychologique → Santé subjective	0,194	0,144	0,192	0,161
Instruction → Locus de contrôle	0,396	0,360	0,411	0,401
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,083^{A}	-0,085	-0,145 ^{A}	-0,146
Santé physique → Santé psychologique	0,202^{A}	0,250^{B}	0,296^{*A}	0,455^{*B}
Santé physique → Santé subjective	0,428	0,429	0,417	0,345
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,103	-0,069	-0,076	-0,099
Consommation d'alcool → Santé subjective	-0,072^{A}	-0,062^{B}	-0,144^{A}	-0,177^{B}
Instruction → Consommation d'alcool	0,165	0,094^{B}	0,222	0,282^{B}
Santé psychologique → Consommation d'alcool	**0,091**	0,026	0,025	0,017
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,117	-0,128	-0,093	-0,113
Soutien social → Santé psychologique	0,109	0,154	0,128	0,127
Santé physique ↔ Instruction	-0,095	-0,066	-0,099	-0,052
Santé physique ↔ Soutien social	0,023	0,053	0,064	0,070
Soutien social ↔ Instruction	-0,022	-0,048	-0,046	-0,014

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre Estoniens et non-Estoniens pour un même sexe.
$^{A, B}$ indique des paramètres significativement différents entre hommes et femmes parmi les Estoniens ou les non-Estoniens.

Tableau 299 : Coefficients de régression selon le quartile de revenus. Hommes et femmes, Estonie, 1996.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Santé psychologique → Santé subjective	**0,157**	0,214	0,131	0,196	0,228	0,178	0,179	0,131
Instruction → Locus de contrôle	0,676^{ab}	0,324^{a}	0,280^{b}	0,392	0,484	0,358	0,347	0,370
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,130	-0,091	-0,071	-0,097	-0,191	-0,159	-0,121	-0,166
Santé physique → Santé psychologique	0,318	0,231^{A}	0,181^{B}	0,133	0,279	0,418^{aA}	0,299^{B}	0,104^{a}
Santé physique → Santé subjective	0,435	0,428	0,439	0,315	0,387	0,389	0,377	0,407
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,053	-0,090	-0,084	-0,135	-0,133	-0,078	-0,072	-0,112
Consommation d'alcool → Santé subjective	-0,053	-0,033	-0,102	-0,021	-0,204	-0,140	-0,126	-0,177
Instruction → Consommation d'alcool	0,268	0,077	0,099	0,197	0,142	0,215	0,225	0,153
Santé psychologique → Consommation d'alcool	**0,240**	-0,031^{a}	0,043^{b}	0,395^{abA}	0,047	0,004	0,033	0,073^{A}
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,287^{A}	-0,073	**-0,084**	-0,199	0,060^{A}	-0,128	-0,126	0,033
Soutien social → Santé psychologique	0,106	0,102	0,126	0,143	**0,071**	0,121	0,149	0,234
Santé physique ↔ Instruction	-0,071	-0,098	-0,070	-0,035	-0,059	-0,085	-0,071	-0,018
Santé physique ↔ Soutien social	-0,068	0,078	0,019	0,006	0,134	0,046	0,057	0,090
Soutien social ↔ Instruction	-0,094	-0,043	0,000	0,018	**-0,072**	-0,028	-0,006	0,001

A : premier quartile, **B** : deuxième quartile, **C** : troisième quartile et **D :** quatrième quartile .
Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
$^{a, b}$ indique des paramètres significativement différents entre deux groupes économiques pour un même sexe.
$^{A, B}$ indique des paramètres significativement différents entre hommes et femmes au sein d'un même groupe économique.

Tableau 300 : Coefficients de régression selon le groupe d'âge. Hommes et femmes, Estonie, 1996.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60+**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60+**
Santé psychologique → Santé subjective	0,057*	0,112	0,210	0,230*	0,164	0,143	0,175	0,199
Instruction → Locus de contrôle	0,447	0,466	0,399	0,221	0,553*	0,231	0,289	0,256*
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,062	-0,066[A]	-0,053	-0,119	-0,077*	-0,195*[A]	-0,143	-0,152
Santé physique → Santé psychologique	0,189	0,171[A]	0,122*	0,303*	0,226*	0,336[A]	0,276	0,410*
Santé physique → Santé subjective	0,280	0,341	0,312	0,357	0,322	0,266	0,269	0,337
Locus de contrôle → Santé subjective	**-0,047**	-0,077	-0,110	-0,062	-0,061	-0,049	-0,113*	-0,023*
Consommation d'alcool → Santé subjective	0,000	-0,038	**-0,053**	**-0,044**	-0,020	-0,078	-0,145	**-0,063**
Instruction → Consommation d'alcool	**0,154**	**0,123**	0,067	0,022	0,152	0,191	0,175	0,088
Santé psychologique → Consommation d'alcool	0,095	0,169	0,064	-0,009	**0,084**	**0,070**	0,009	-0,002
Santé physique → Consommation d'alcool	-0,024	-0,026	-0,008	-0,084	0,018	-0,028	-0,079	-0,059
Soutien social → Santé psychologique	0,064	0,128	0,171	0,114	0,171	0,081	0,119	0,156
Santé physique ↔ Instruction	-0,039	-0,044	-0,049	-0,059	-0,002	0,010	-0,035	-0,039
Santé physique ↔ Soutien social	-0,016	0,058	0,079	0,019	0,033	0,074	**0,046**	0,052
Soutien social ↔ Instruction	-0,021	-0,050	-0,078	-0,012	-0,013	-0,023	-0,037	**-0,024**

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre deux groupes d'âges pour un même sexe.
[A] Les paramètres présentent des différences significatives entre hommes et femmes pour un même groupe d'âges.

Chapitre V :

Le rôle spécifique de l'alcool

1. Deux mesures de la consommation d'alcool
1.1. Taux de prévalence de la consommation d'alcool

Tableau 301A : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool, le groupe d'âges et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Abstèmes	28.8	24.3	26.4	56.5	47.1	44.0	53.1	82.2
1 à 3 fois par mois	45.6	45.8	46.1	29.7	44.9	44.7	39.3	15.4
1 à 2 fois par semaine	20.3	22.6	19.0	10.2	7.4	10.6	6.4	2.0
3 fois par semaine ou plus	5.3	7.2	8.4	3.6	0.7	0.7	1.2	0.3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 301B : Comparaison des proportions selon la fréquence de consommation d'alcool, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Abstèmes				ABC			B	ABC
1 à 3 fois par mois	D	D	D		D	D	D	
1 à 2 fois par semaine	D	D	D		D	D	D	
3 fois par semaine ou plus		D	D					

Tableau 302A : Distribution de la population selon la quantité d'alcool, le groupe d'âges et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60 et plus**
Abstèmes	28.8	24.3	26.4	56.4	47.1	43.7	53.1	82.2
1 à 3 verres	12.3	8.3	11.7	11.1	25.5	29.0	27.0	13.5
4 à 5 verres	12.3	13.7	13.4	10.4	16.7	17.2	13.0	3.0
6 verres ou plus	46.6	53.6	48.5	22.1	10.8	10.1	6.8	1.3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 302B : Comparaison des proportions selon la quantité d'alcool, le groupe d'âge et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	18-29 (A)	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**	**18-29 (A)**	**30-44 (B)**	**45-59 (C)**	**60 et plus (D)**
Abstèmes				ABC			B	ABC
1 à 3 verres					D	D	D	
4 à 5 verres					D	D	D	
6 verres ou plus	D	D	D		D	D	D	

Tableau 303 : Distribution de la population selon l'indicateur de consommation d'alcool et l'ethnie, population masculine.

Fréquence			**Quantité**		
	Estoniens	Non-Estoniens	Estoniens	Non-Estoniens	
Abstèmes	36.3	34.9	36.2	34.9	Abstèmes
1 à 3 fois par mois	38.2	45.6	11.8	8.6	1 à 3 verres
1 à 2 fois par semaine	17.9	16.6	13.0	11.0	4 à 5 verres
3 fois par semaine ou +	7.6	2.9	39.0	45.5	6 verres ou +
	100%	100%	100%	100%	

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 304 : Distribution de la population selon l'indicateur de consommation d'alcool et l'ethnie, population féminine.

Fréquence			**Quantité**		
	Estoniennes	Non-Estoniennes	Estoniennes	Non-Estoniennes	
Abstèmes	61.9	62.4	61.9	62.3	Abstèmes
1 à 3 fois par mois	31.5	31.7	22.3	20.3	1 à 3 verres
1 à 2 fois par semaine	6.1	4.9	10.6	10.1	4 à 5 verres
3 fois par semaine ou +	0.5	1.0	5.2	7.3	6 verres ou +
	100%	100%	100%	100%	

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 305A : Distribution de la population selon la fréquence de consommation d'alcool, le groupe économique et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Abstèmes	32.8	41.4	35.7	23.0	57.8	70.4	59.5	42.0
1 à 3 fois par mois	39.3	38.5	41.7	42.7	38.0	25.3	33.3	45.0
1 à 2 fois par semaine	19.1	15.3	16.8	25.4	3.4	3.8	6.5	12.1
3 fois par semaine ou plus	8.7	4.7	5.8	8.9	0.8	0.5	0.7	0.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 305B : Comparaison des proportions selon la fréquence de consommation d'alcool, le groupe économique et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Abstèmes		D	D		D	ACD	D	
1 à 3 fois par mois					B		B	BC
1 à 2 fois par semaine				BC			B	ABC
3 fois par semaine ou plus								

Tableau 306A : Distribution de la population selon la quantité d'alcool, le groupe économique et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Abstèmes	32.4	41.4	35.6	23.0	57.8	70.3	59.5	42.0
1 à 3 verres	9.3	8.8	11.9	12.1	15.2	18.3	24.4	30.7
4 à 5 verres	7.1	10.2	14.0	16.5	13.9	7.3	10.7	18.6
6 verres ou plus	51.1	39.6	38.6	48.4	13.1	4.1	5.4	8.7
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 306B: Comparaison des proportions selon la quantité d'alcool, le groupe économique et le sexe.

	Hommes				**Femmes**			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Abstèmes		D	D		D	ACD	D	
1 à 3 verres							AB	AB
4 à 5 verres				AB	B		B	BC
6 verres ou plus	BC			C	BC			B

1.2. Les résultats du modèle

Tableau 307 : Ajustement des modèles (Posterior predictive p-values).

	Fréquence		**Quantité**	
	Hommes	**Femmes**	**Hommes**	**Femmes**
Population totale	0.50	0.49	0.49	0.50
18-29 ans	0.49	0.56	0.49	0.59
30-44 ans	0.49	0.49	0.51	0.50
45-59 ans	0.50	0.48	0.50	0.51
60 ans et +	0.51	0.50	0.51	0.50
Estoniens	0.50	0.50	0.50	0.50
Non-Estoniens	0.50	0.49	0.51	0.50
Premier quartile de revenus	0.50	0.50	0.50	0.50
Deuxième quartile de revenus	0.50	0.50	0.50	0.51
Troisième quartile de revenus	0.49	0.49	0.49	0.50
Quatrième quartile de revenus	0.49	0.50	0.50	0.50

1.2.1. Consommation d'alcool → Santé subjective

Tableau 308 : Coefficients de régression selon le groupe d'âges, Estonie, 1996. Population masculine.

	Fréquence				Quantité			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60+**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60+**
Santé psychologique → Santé subjective	0,057*	0,112	0,210	0,230*	0,046*	0,109	0,208	0,230*
Instruction → Locus de contrôle	0,447	0,466	0,399	0,221	0,443	0,464	0,399	0,220
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,062	-0,066[A]	-0,053	-0,119	-0,063	-0,069[A]	-0,054	-0,122
Santé physique → Santé psychologique	0,189	0,171[A]	0,122*	0,303*	0,186	0,172[A]	0,118*	0,301*
Santé physique → Santé subjective	0,280	0,341	0,312	0,357	0,283	0,341	0,311	0,355
Locus de contrôle → Santé subjective	**-0,047**	-0,077	-0,110	-0,062	**-0,049**	-0,081	-0,112	-0,064
Consommation d'alcool → Santé subjective	*0,000*	*-0,038*	***-0,053***	***-0,044***	*0,007*	*-0,038*	*-0,028*	*-0,022*
Instruction → Consommation d'alcool	***0,154***	***0,123***[a]	*0,067*	*0,022*	*0,027*	*-0,283*[a]	*-0,033*	*-0,034*
Santé psychologique → Consommation d'alcool	*0,095*	*0,169*	*0,064*	*-0,009*	*0,024*	***0,174***	*-0,066*	*-0,028*
Santé physique → Consommation d'alcool	*-0,024*	*-0,026*	*-0,008*	*-0,084*	*-0,037*	***-0,167***	*-0,036*	*-0,064*
Soutien social → Santé psychologique	0,064	0,128	0,171	0,114	0,062	0,128	0,176	0,114
Santé physique ↔ Instruction	-0,039	-0,044	-0,049	-0,059	-0,041	-0,044	-0,052	-0,057
Santé physique ↔ Soutien social	-0,016	0,058	0,079	0,019	-0,016	0,057	0,079	0,021
Soutien social ↔ Instruction	-0,021	-0,050	-0,078	-0,012	-0,021	-0,049	-0,077	-0,011

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre deux groupes d'âges pour un même sexe.
[a] Le paramètre est significativement différent de celui obtenu lorsque l'attitude à l'égard de l'alcool est mesurée par la fréquence de consommation.
[A,B] Les paramètres présentent des différences significatives entre hommes et femmes pour un même groupe d'âges.

Tableau 309 : Coefficients de régression selon le groupe d'âge. Estonie, 1996. Population féminine.

	Fréquence				Quantité			
	18-29	**30-44**	**45-59**	**60+**	**18-29**	**30-44**	**45-59**	**60+**
Santé psychologique → Santé subjective	0,164	0,143	0,175	0,199				
Instruction → Locus de contrôle	0,553*	0,231	0,289	0,256*				
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,077*	-0,195*A	-0,143	-0,152				
Santé physique → Santé psychologique	0,226*	0,336A	0,276	0,410*				
Santé physique → Santé subjective	0,322	0,266	0,269	0,337				
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,061	-0,049	-0,113*	-0,023*				
Consommation d'alcool → Santé subjective	*-0,020*	*-0,078*	*-0,145*	***-0,063***	*-0,009*	*-0,070*	*-0,070*	***-0,054***
Instruction → Consommation d'alcool	*0,152*	*0,191*	*0,175*	*0,088*	*0,107*	*-0,006*	*0,146*	*0,114*
Santé psychologique → Consommation d'alcool	***0,084***	***0,070***	*0,009*	*-0,002*	*0,229*	***0,111***	*0,055*	*-0,005*
Santé physique → Consommation d'alcool	*0,018*	*-0,028*	*-0,079*	*-0,059*	*0,048*	*0,005*	*-0,184*	*-0,073*
Soutien social → Santé psychologique	0,171	0,081	0,119	0,156				
Santé physique ↔ Instruction	-0,002	0,010	-0,035	-0,039				
Santé physique ↔ Soutien social	0,033	0,074	**0,046**	0,052				
Soutien social ↔ Instruction	-0,013	-0,023	-0,037	**-0,024**				

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre deux groupes d'âges pour un même sexe.
A Les paramètres présentent des différences significatives entre hommes et femmes pour un même groupe d'âges.
Aucun paramètre n'est significativement différent selon l'indicateur de consommation d'alcool.

Tableau 310 : Coefficients de régression selon l'origine ethnique. Estonie, 1996. Population masculine.

	Fréquence		Quantité	
	Est.	**Non-Est.**	**Est.**	**Non-Est.**
Santé psychologique → Santé subjective	0,194	0,144		
Instruction → Locus de contrôle	0,396	0,360		
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,083[A]	-0,085		
Santé physique → Santé psychologique	0,202[A]	0,250[B]		
Santé physique → Santé subjective	0,428	0,429		
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,103	-0,069		
Consommation d'alcool → Santé subjective	*-0,072[A]*	*-0,062[B]*	*-0,054[A]*	*-0,046[B]*
Instruction → Consommation d'alcool	*0,165*	*0,094[B]*	***0,094***	*0,005[B]*
Santé psychologique → Consommation d'alcool	***0,091***	*0,026*	*0,040*	*-0,059*
Santé physique → Consommation d'alcool	*-0,117*	*-0,128*	*-0,203*	*-0,279*
Soutien social → Santé psychologique	0,109	0,154		
Santé physique ↔ Instruction	-0,095	-0,066		
Santé physique ↔ Soutien social	0,023	0,053		
Soutien social ↔ Instruction	-0,022	-0,048		

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre Estoniens et non-Estoniens pour un même sexe.
[A, B] indique des paramètres significativement différents entre hommes et femmes parmi les Estoniens ou les non-Estoniens.
Aucun paramètre n'est significativement différent selon l'indicateur de consommation d'alcool.

Tableau 311 : Coefficients de régression selon l'origine ethnique. Estonie, 1996. Population féminine.

	Fréquence		Quantité	
	Est.	**Non-Est.**	**Est.**	**Non-Est.**
Santé psychologique → Santé subjective	0,192	0,161		
Instruction → Locus de contrôle	0,411	0,401		
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,145[A]	-0,146		
Santé physique → Santé psychologique	0,296*[A]	0,455*[B]		
Santé physique → Santé subjective	0,417	0,345		
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,076	-0,099		
Consommation d'alcool → Santé subjective	*-0,144[A]*	*-0,177[B]*	*-0,107[A]*	*-0,124[B]*
Instruction → Consommation d'alcool	*0,222*	*0,282[B]*	*0,243*	*0,372[B]*
Santé psychologique → Consommation d'alcool	*0,025*	*0,017*	*0,026*	*0,079*
Santé physique → Consommation d'alcool	*-0,093*	*-0,113*	*-0,165*	*-0,183*
Soutien social → Santé psychologique	0,128	0,127		
Santé physique ↔ Instruction	-0,099	-0,052		
Santé physique ↔ Soutien social	0,064	0,070		
Soutien social ↔ Instruction	-0,046	-0,014		

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre Estoniens et non-Estoniens pour un même sexe.
[A, B] indique des paramètres significativement différents entre hommes et femmes parmi les Estoniens ou les non-Estoniens.
Aucun paramètre n'est significativement différent selon l'indicateur de consommation d'alcool.

Tableau 312 : Coefficients de régression selon le quartile de revenus. Estonie, 1996. Population masculine.

	Fréquence				Quantité			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Santé psychologique → S. subjective	**0,157**	0,214	0,131	0,196				
Instruction → Locus de contrôle	0,676^{ab}	0,324^{a}	0,280^{b}	0,392				
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,130	-0,091	-0,071	-0,097				
Santé physique → S. psychologique	0,318	0,231^{A}	0,181^{B}	0,133				
Santé physique → Santé subjective	0,435	0,428	0,439	0,315				
Locus de contrôle → S. subjective	-0,053	-0,090	-0,084	-0,135				
Cons. d'alcool → Santé subjective	*-0,053*	*-0,033*	*-0,102*	*-0,021*	*-0,036*	*-0,020^{aA}*	*-0,082^{ab}*	*-0,002^{b}*
Instruction → Cons. d'alcool	*0,268*	*0,077*	*0,099*	*0,197*	*0,188*	*0,084*	*0,007^{A}*	*0,018*
S. psychologique → Cons. d'alcool	***0,240***	*-0,031^{a}*	*0,043^{b}*	*0,395^{abA}*	*0,045*	*-0,056*	*0,003*	*0,187*
Santé physique → Cons. d'alcool	*-0,287^{A}*	*-0,073*	***-0,084***	*-0,199*	*-0,225*	*-0,171*	*-0,285*	*-0,169*
Soutien social → S. psychologique	0,106	0,102	0,126	0,143				
Santé physique ↔ Instruction	-0,071	-0,098	-0,070	-0,035				
Santé physique ↔ Soutien social	-0,068	0,078	0,019	0,006				
Soutien social ↔ Instruction	-0,094	-0,043	0,000	0,018				

A : premier quartile, **B** : deuxième quartile, **C** : troisième quartile et **D :** quatrième quartile .
Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
a, b indique des paramètres significativement différents entre deux groupes économiques pour un même sexe.
A, B indique des paramètres significativement différents entre hommes et femmes au sein d'un même groupe économique.
Aucun paramètre n'est significativement différent selon l'indicateur de consommation d'alcool.

Tableau 313 : Coefficients de régression selon le quartile de revenus. Estonie, 1996. Population féminine.

	Fréquence				Quantité			
	A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
Santé psychologique → Santé subjective	0,228	0,178	0,179	0,131				
Instruction → Locus de contrôle	0,484	0,358	0,347	0,370				
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,191	-0,159	-0,121	-0,166				
Santé physique → Santé psychologique	0,279	0,418^{aA}	0,299^{B}	0,104^{a}				
Santé physique → Santé subjective	0,387	0,389	0,377	0,407				
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,133	-0,078	-0,072	-0,112				
Consommation d'alcool → Santé subjective	*-0,204*	*-0,140*	*-0,126*	*-0,177*	*-0,119*	*-0,115^{A}*	*-0,094*	*-0,097*
Instruction → Consommation d'alcool	*0,142*	*0,215*	*0,225*	*0,153*	*0,189*	*0,260*	*0,248^{A}*	*0,240*
Santé psychologique → Cons. d'alcool	*0,047*	*0,004*	*0,033*	*0,073^{A}*	*0,133*	*0,002*	*0,080*	*0,029*
Santé physique → Consommation d'alcool	*0,060^{A}*	*-0,128*	*-0,126*	*0,033*	*0,075*	*-0,188*	*-0,193*	*-0,056*
Soutien social → Santé psychologique	**0,071**	0,121	0,149	0,234				
Santé physique ↔ Instruction	-0,059	-0,085	-0,071	-0,018				
Santé physique ↔ Soutien social	0,134	0,046	0,057	0,090				
Soutien social ↔ Instruction	**-0,072**	-0,028	-0,006	0,001				

A : premier quartile, **B** : deuxième quartile, **C** : troisième quartile et **D :** quatrième quartile .
Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
a, b indique des paramètres significativement différents entre deux groupes économiques pour un même sexe.
A, B indique des paramètres significativement différents entre hommes et femmes au sein d'un même groupe économique.
Aucun paramètre n'est significativement différent selon l'indicateur de consommation d'alcool.

2. Les consommateurs d'alcool

2.1. Consommateurs d'alcool et populations totales

2.1.1. Taux de prévalence

Enquêtes NORBALT

Tableau 314 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et population totale, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	**Tous**	**CA**	**Tous**	**CA**	**Tous**	**CA**	**Tous**	**CA**	**Tous**	**CA**	**Tous**
Bonne	41.2	37.6	39.8	30.2	38.2	33.9	26.3	18.4	45.6	40.2	33.0	23.3
Moyenne	47.8	46.6	48.7	47.8	49.0	48.4	58.4	51.3	46.0	45.0	55.5	52.4
Mauvaise	11.0	15.9	11.5	22.0	12.7	17.7	15.3	30.3	8.3	14.8	11.5	24.3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 315 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et population totale, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous
Bonne	37.1	36.5	22.3	19.7	50.8	48.1	26.7	23.3	57.2	52.8	31.4	26.7
Moyenne	41.2	40.1	39.1	38.3	35.0	34.7	39.1	38.8	31.9	33.5	45.9	41.6
Mauvaise	21.7	23.4	38.6	42.0	14.3	17.2	34.2	37.9	10.9	13.7	22.6	31.7
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 316 : Distribution de la population selon l'état de santé physique, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et population totale, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous
Aucune maladie	63.0	58.8	54.9	48.8	73.4	68.3	74.9	63.5	77.1	72.8	71.5	64.8
Maladie avec de légères limitations	30.8	31.5	37.9	37.4	19.8	21.0	17.3	20.3	15.2	14.6	20.5	18.1
Maladies avec de sévères limitations	6.2	9.6	7.2	13.8	6.7	10.7	7.9	16.2	7.7	12.6	8.0	17.1
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 317 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et population totale, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous
Totalement externe	17.2	19.2	22.3	27.1	25.5	26.5	35.3	38.0	39.1	39.8	43.5	48.6
Externe	29.0	28.9	32.4	33.8	33.2	33.6	36.7	37.8	31.9	33.7	35.0	33.8
Interne	31.7	31.0	28.6	26.2	33.7	32.7	21.9	20.2	23.9	21.8	18.1	15.5
Totalement interne	22.1	20.8	16.7	13.0	7.7	7.2	6.0	4.0	5.1	4.7	3.3	2.1
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 318 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et population totale, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous
Primaire ou inférieur	29.0	32.2	17.5	27.6	29.5	33.8	20.2	34.2	28.3	32.6	18.3	34.5
Secondaire	55.3	52.9	61.5	56.6	54.3	50.2	57.0	49.8	57.1	54.0	59.8	49.9
Supérieur	15.7	14.9	21.3	15.8	16.2	16.0	22.8	15.9	14.6	13.4	21.9	15.6
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 319 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et population totale, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous
Bonne	39.2	36.9	36.2	29.3	36.2	32.4	32.2	21.8	46.7	43.3	35.9	26.2
Moyenne	51.4	49.8	53.8	51.7	51.7	49.5	53.5	48.1	47.5	45.9	57.8	54.4
Mauvaise	9.4	13.3	10.0	19.0	12.2	18.1	14.3	30.1	5.8	10.8	6.3	19.5
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 320 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et population totale, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous
Bonne	50.2	50.4	33.7	32.8	53.5	50.7	34.3	30.5	62.0	61.1	36.5	35.7
Moyenne	37.6	36.7	46.5	44.8	33.0	33.3	38.6	38.0	29.6	29.6	44.2	41.2
Mauvaise	12.2	13.0	19.8	22.4	13.5	16.0	27.0	31.4	8.4	9.3	19.4	23.0
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 321 : Distribution de la population selon l'état de santé physique, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et population totale, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous
Aucune maladie	71.5	68.4	65.8	60.4	78.1	73.6	80.7	70.1	89.4	87.8	86.3	81.3
Maladie avec de légères limitations	24.8	24.9	28.6	28.8	17.5	18.6	16.0	18.3	7.9	7.2	9.8	9.4
Maladies avec de sévères limitations	3.7	6.7	5.6	10.8	4.4	7.8	3.2	11.6	2.7	5.0	3.9	9.3
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 322 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et population totale, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous
Totalement externe	15.6	16.6	16.3	20.6	21.9	24.3	25.7	31.7	49.2	49.0	52.4	57.3
Externe	22.8	24.0	27.6	30.6	32.6	33.2	35.9	37.7	27.9	27.2	27.6	27.7
Interne	30.6	30.4	32.1	29.4	37.2	34.9	30.3	24.1	21.1	21.6	18.6	13.1
Totalement interne	31.0	29.0	23.9	19.3	8.3	7.6	8.0	6.4	1.9	2.3	1.4	1.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 323 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et population totale, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous
Primaire ou inférieur	26.5	29.1	16.2	26.6	30.2	35.2	18.5	31.1	28.8	33.1	20.1	34.0
Secondaire	44.2	43.4	41.6	39.5	43.0	41.1	38.5	37.0	39.9	38.2	37.8	34.4
Supérieur	29.2	27.4	42.2	33.9	26.8	23.7	42.6	32.0	31.3	28.7	42.1	31.6
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 324 : Distribution de la population selon le degré de satisfaction à l'égard du soutien social, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et population totale, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous	CA	Tous
Très satisfait	89.4	89.3	89.9	88.0	86.7	87.2	90.0	88.5	89.5	88.3	91.8	90.1
Satisfait	5.7	5.7	5.6	5.8	7.7	6.8	6.1	6.0	6.6	6.4	3.2	4.3
Insatisfait	2.7	2.6	2.1	2.7	3.0	3.1	2.7	3.6	2.6	3.1	2.4	2.4
Très insatisfait	2.2	2.5	2.4	3.5	2.6	3.0	1.2	1.9	1.3	2.1	2.7	3.2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Enquête EHIS

Tableau 325 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		Femmes	
	Consommateurs d'alcool	Population totale	Consommatrices d'alcool	Population totale
Bonne	44.2	40.1	45.3	33.7
Moyenne	48.0	48.3	46.5	50.0
Mauvaise	7.8	11.6	8.2	16.3
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 326 : Distribution de la population selon l'état de santé physique et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		Femmes	
	Consommateurs d'alcool	Population totale	Consommatrices d'alcool	Population totale
Bonne	37.7	35.2	27.7	24.3
Moyenne	52.1	50.4	62.3	57.1
Mauvaise	10.3	14.3	10.1	18.7
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 327 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		**Femmes**	
	Consommateurs d'alcool	Population totale	Consommatrices d'alcool	Population totale
Bonne	77.0	76.2	63.5	61.3
Moyenne	17.6	17.3	23.8	22.7
Mauvaise	5.3	6.5	12.6	16.1
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 328 : Distribution de la population selon la satisfaction à l'égard du soutien social et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		**Femmes**	
	Consommateurs d'alcool	Population totale	Consommatrices d'alcool	Population totale
Très satisfait	57.4	57.1	55.6	53.2
Plutôt satisfait	28.1	27.6	28.3	29.6
Plutôt insatisfait	11.1	11.6	11.2	11.9
Très insatisfait	3.4	3.8	4.8	5.3
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 329 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		**Femmes**	
	Consommateurs d'alcool	Population totale	Consommatrices d'alcool	Population totale
Totalement externe	9.9	10.5	10.2	15.3
Externe	20.4	22.4	23.7	26.8
Interne	36.6	34.0	37.1	33.5
Totalement interne	33.0	33.0	28.9	24.3
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 330 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		**Femmes**	
	Consommateurs d'alcool	Population totale	Consommatrices d'alcool	Population totale
Primaire ou inférieur	30.3	35.1	17.9	34.7
Secondaire	55.7	51.3	63.5	52.3
Supérieur	13.9	13.6	18.6	13.0
	100%	100%	100%	100%

Les paramètres

Tableau 331 : Ajustement des modèles, populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux dernières semaines (Posterior predictive p-values).

	Estonie			**Lettonie**		**Lituanie**	
	1994	**1999**	**EHIS-1996**	**1994**	**1999**	**1994**	**1999**
Hommes	0,49	0,49	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
Femmes	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50	0,51

Tableau 332 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Estonie, Hommes, 1994 (Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	48,6%	31,9%	19,6%	100%	35,9%	36,1%	27,9%	100%
1 jour	62,0%	30,8%	7,2%	100%	38,5%	40,1%	21,4%	100%
2 ou 3 jours	64,5%	31,5%	4,0%	100%	35,7%	44,6%	19,8%	100%
4 jours ou plus	63,4%	29,2%	7,4%	100%	35,0%	36,9%	28,1%	100%

Tableau 333 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Estonie, Femmes, 1994 (Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	42,8%	37,6%	19,7%	100%	16,5%	37,3%	46,1%	100%
1 jour	54,4%	37,9%	7,7%	100%	22,0%	39,3%	38,8%	100%
2 ou 3 jours	59,8%	35,1%	5,2%	100%	23,6%	38,5%	37,9%	100%
4 jours ou plus	41,5%	51,2%	7,3%	100%	22,5%	40,0%	37,5%	100%

Tableau 334 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Estonie, Hommes,1999 (Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	60,9%	26,0%	13,1%	100%	50,4%	34,6%	14,9%	100%
1 jour	71,5%	24,3%	4,3%	100%	53,8%	35,1%	11,1%	100%
2 ou 3 jours	75,4%	22,0%	2,7%	100%	47,3%	39,1%	13,6%	100%
4 jours ou plus	65,0%	30,5%	4,5%	100%	46,3%	41,1%	12,6%	100%

Tableau 335 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Estonie, Femmes, 1999(Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	55,4%	29,0%	15,5%	100%	31,8%	43,6%	24,6%	100%
1 jour	63,7%	29,6%	6,7%	100%	32,1%	47,7%	20,2%	100%
2 ou 3 jours	70,5%	26,8%	2,8%	100%	36,5%	46,3%	17,3%	100%
4 jours ou plus	70,8%	25,0%	4,2%	100%	40,8%	30,6%	28,6%	100%

Tableau 336 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Lettonie, Hommes, 1994 (Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	57,8%	23,2%	19,0%	100%	43,3%	33,8%	22,9%	100%
1 jour	72,4%	20,4%	7,3%	100%	51,8%	34,2%	14,0%	100%
2 ou 3 jours	77,9%	17,1%	5,0%	100%	51,3%	36,2%	12,6%	100%
4 jours ou plus	69,2%	23,1%	7,7%	100%	40,0%	36,9%	23,1%	100%

Tableau 337 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Lettonie, Femmes, 1994 (Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	55,6%	22,4%	22,1%	100%	21,2%	38,1%	40,7%	100%
1 jour	74,4%	17,4%	8,2%	100%	27,6%	39,0%	33,4%	100%
2 ou 3 jours	80,0%	16,0%	4,0%	100%	17,6%	41,9%	40,5%	100%
4 jours ou plus	85,7%	14,3%	0%	100%	28,6%	28,6%	42,9%	100%

Tableau 338 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Lettonie, Hommes, 1999 (Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	66,3%	20,6%	13,1%	100%	46,1%	34,0%	20,0%	100%
1 jour	79,9%	15,7%	4,4%	100%	54,1%	34,5%	11,4%	100%
2 ou 3 jours	76,6%	19,7%	3,7%	100%	54,3%	31,9%	13,8%	100%
4 jours ou plus	70,7%	23,2%	6,1%	100%	48,2%	25,3%	26,5%	100%

Tableau 339 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Lettonie, Femmes, 1999 (Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	63,5%	19,8%	16,8%	100%	28,1%	37,6%	34,2%	100%
1 jour	80,6%	15,8%	3,5%	100%	34,2%	38,9%	27,0%	100%
2 ou 3 jours	82,7%	16,0%	1,2%	100%	37,8%	32,9%	29,3%	100%
4 jours ou plus	77,8%	16,7%	5,6%	100%	22,2%	55,6%	22,2%	100%

Tableau 340 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Lituanie, Hommes, 1994 (Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	61,7%	14,4%	23,8%	100%	41,2%	37,5%	21,3%	100%
1 jour	74,5%	15,6%	9,9%	100%	58,2%	31,9%	9,9%	100%
2 ou 3 jours	81,7%	13,7%	4,6%	100%	58,9%	31,1%	10,0%	100%
4 jours ou plus	75,6%	16,8%	7,6%	100%	50,0%	33,9%	16,1%	100%

Tableau 341 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Lituanie, Femmes, 1994 (Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	59,2%	15,9%	24,9%	100%	22,0%	39,5%	38,6%	100%
1 jour	69,6%	21,5%	8,9%	100%	31,0%	44,9%	24,1%	100%
2 ou 3 jours	77,3%	17,5%	5,2%	100%	35,1%	49,5%	15,5%	100%
4 jours ou plus	77,8%	22,2%	0%	100%	29,6%	51,9%	18,5%	100%

Tableau 342 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Lituanie, Hommes, 1999 (Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	83,3%	7,1%	9,6%	100%	57,7%	30,5%	11,9%	100%
1 jour	90,0%	7,6%	2,4%	100%	61,8%	30,6%	7,5%	100%
2 ou 3 jours	88,7%	8,7%	2,6%	100%	61,6%	29,0%	9,4%	100%
4 jours ou plus	87,6%	7,6%	4,8%	100%	62,5%	27,9%	9,6%	100%

Tableau 343 : Distribution de la population selon la santé physique, la santé mentale et la fréquence de consommation d'alcool, Lituanie, Femmes, 1999 (Pourcentages calculés à partir des effectifs pondérés).

	Santé physique				**Santé mentale**			
Consommation d'alcool	Bonne	Moyenne	Mauvaise		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Abstème	78,4%	9,3%	12,4%	100%	35,5%	39,6%	24,9%	100%
1 jour	87,3%	9,8%	2,9%	100%	37,9%	45,1%	16,9%	100%
2 ou 3 jours	85,2%	8,6%	6,2%	100%	33,7%	43,4%	22,9%	100%
4 jours ou plus	80,0%	12,0%	8,0%	100%	26,9%	34,6%	38,5%	100%

2.2. Consommateurs d'alcool et abstèmes

2.2.1. Les taux de prévalences

Enquêtes NORBALT

Tableau 344 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et abstèmes, 1994.

	Estonie				**Lettonie**				**Lituanie**			
	Hommes		**Femmes**		**Hommes**		**Femmes**		**Hommes**		**Femmes**	
	CA	**Abst.**	**CA**	**Abst.**	**CA**	**Abst.**	**CA**	**Abst.**	**CA**	**Abst.**	**CA**	**Abst.**
Bonne	41.2	27.5	39.8	20.9	38.2	25.4	26.3	13.0	45.6	26.9	33.0	14.9
Moyenne	47.8	43.3	48.7	47.6	49.0	46.9	58.4	46.1	46.0	43.3	55.5	50.5
Mauvaise	11.0	29.2	11.5	31.5	12.7	27.7	15.3	40.9	8.3	29.8	11.5	34.6
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 345 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et abstèmes, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.
Bonne	37.1	36.0	22.3	16.5	50.8	43.3	26.7	21.2	57.2	41.1	31.4	21.9
Moyenne	41.2	36.1	39.1	37.4	35.0	33.9	39.1	38.1	31.9	37.5	45.9	39.5
Mauvaise	21.7	27.9	38.6	46.1	14.3	22.8	34.2	40.7	10.9	21.4	22.6	38.5
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 346 : Distribution de la population selon l'état de santé physique, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et abstèmes, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.
Aucune maladie	63.0	48.6	54.9	42.8	73.4	57.8	74.9	55.6	77.1	61.7	71.5	59.2
Maladie avec de légères limitations	30.8	31.9	37.9	37.6	19.8	23.2	17.3	22.4	15.2	14.5	20.5	16.0
Maladies avec de sévères limitations	6.2	19.6	7.2	19.6	6.7	19.0	7.9	22.1	7.7	23.8	8.0	24.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 347 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et abstèmes, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.
Totalement externe	17.2	23.6	22.3	31.4	25.5	29.1	35.3	40.1	39.1	40.2	43.5	53.5
Externe	29.0	30.2	32.4	35.8	33.2	33.4	36.7	38.7	31.9	38.6	35.0	32.4
Interne	31.7	29.3	28.6	23.7	33.7	31.4	21.9	18.7	23.9	17.4	18.1	13.2
Totalement interne	22.1	16.8	16.7	9.0	7.7	6.1	6.0	2.6	5.1	3.8	3.3	0.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 348 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et abstèmes, 1994.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.
Primaire ou inférieur	29.0	39.4	17.5	36.0	29.5	42.1	20.2	43.7	28.3	42.6	18.3	46.8
Secondaire	55.3	48.7	61.5	52.8	54.3	42.0	57.0	45.1	57.1	45.1	59.8	41.8
Supérieur	15.7	11.9	21.3	11.2	16.2	15.9	22.8	11.2	14.6	12.3	21.9	11.4
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 349 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et abstèmes, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.
Bonne	39.2	32.2	36.2	23.4	36.2	26.7	32.2	15.4	46.7	33.0	35.9	21.4
Moyenne	51.4	45.7	53.8	49.9	51.7	45.8	53.5	44.8	47.5	46.4	57.8	52.8
Mauvaise	9.4	22.1	10.0	26.7	12.2	27.4	14.3	39.7	5.8	20.6	6.3	25.8
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 350 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et abstèmes, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.
Bonne	50.2	50.4	33.7	31.8	53.5	46.1	34.3	28.1	62.0	57.7	36.5	35.4
Moyenne	37.6	34.6	46.5	43.6	33.0	34.0	38.6	37.7	29.6	30.5	44.2	39.6
Mauvaise	12.2	15.0	19.8	24.6	13.5	19.9	27.0	34.2	8.4	11.8	19.4	24.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 351 : Distribution de la population selon l'état de santé physique, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et abstèmes, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.
Aucune maladie	71.5	60.9	65.8	55.4	78.1	66.2	80.7	63.4	89.4	83.3	86.3	78.4
Maladie avec de légères limitations	24.8	26.0	28.6	29.1	17.5	20.6	16.0	19.8	7.9	7.1	9.8	9.2
Maladies avec de sévères limitations	3.7	13.1	5.6	15.5	4.4	13.2	3.2	16.8	2.7	9.7	3.9	12.4
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 352 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et abstèmes, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.
Totalement externe	15.6	19.3	16.3	24.3	21.9	27.6	25.7	35.4	49.2	51.6	52.4	59.5
Externe	22.8	25.4	27.6	33.3	32.6	34.7	35.9	39.0	27.9	23.2	27.6	28.3
Interne	30.6	30.3	32.1	27.2	37.2	31.2	30.3	20.2	21.1	22.3	18.6	10.3
Totalement interne	31.0	25.1	23.9	15.2	8.3	6.5	8.0	5.4	1.9	2.9	1.4	1.9
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 353 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et abstèmes, 1999.

	Estonie				Lettonie				Lituanie			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.	CA	Abst.
Primaire ou inférieur	26.5	33.6	16.2	35.1	30.2	42.6	18.5	38.9	28.8	41.6	20.1	41.3
Secondaire	44.2	42.3	41.6	37.9	43.0	38.4	38.5	35.6	39.9	35.5	37.8	33.2
Supérieur	29.2	24.1	42.2	27.0	26.8	19.0	42.6	25.5	31.3	22.9	42.1	25.5
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 354 : Distribution de la population selon le degré de satisfaction à l'égard du soutien social, selon le pays et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et abstèmes, 1999.

	Estonie				**Lettonie**				**Lituanie**			
	Hommes		**Femmes**		**Hommes**		**Femmes**		**Hommes**		**Femmes**	
	CA	**Abst.**	**CA**	**Abst.**	**CA**	**Abst.**	**CA**	**Abst.**	**CA**	**Abst.**	**CA**	**Abst.**
Très satisfait	89.4	88.8	89.9	86.7	86.7	87.8	90.0	87.7	89.5	87.6	91.8	89.4
Satisfait	5.7	5.6	5.6	5.9	7.7	5.5	6.1	5.9	6.6	6.4	3.2	3.2
Insatisfait	2.7	2.2	2.1	3.2	3.0	3.1	2.7	4.1	2.6	3.3	2.4	2.4
Très insatisfait	2.2	3.3	2.4	4.1	2.6	3.6	1.2	2.3	1.3	2.7	2.7	2.7
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CA : Populations ayant consommé de l'alcool au cours des deux semaines précédents l'enquête.
Les cellules grisées indiquent que la différence de proportions entre population totale et population ayant besoin de recourir à des soins de santé pour un pays et un sexe donné est statistiquement significative au seuil de 0,05.

Enquête EHIS

Tableau 355 : Distribution de la population selon l'état de santé subjective et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		Femmes	
	Consommateurs d'alcool	Abstèmes	Consommatrices d'alcool	Abstèmes
Bonne	44,2	32,4	45,3	26,6
Moyenne	48,0	49,0	46,5	52,2
Mauvaise	7,8	18,6	8,2	21,2
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 356 : Distribution de la population selon l'état de santé physique et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		Femmes	
	Consommateurs d'alcool	Abstèmes	Consommatrices d'alcool	Abstèmes
Bonne	37,7	30,9	27,7	22,2
Moyenne	52,1	47,5	62,3	54,0
Mauvaise	10,3	21,6	10,1	23,8
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 357 : Distribution de la population selon l'état de santé psychologique et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		Femmes	
	Consommateurs d'alcool	Abstèmes	Consommatrices d'alcool	Abstèmes
Bonne	77,0	74,7	63,5	59,9
Moyenne	17,6	16,7	23,8	21,9
Mauvaise	5,3	8,6	12,6	18,2
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 358 : Distribution de la population selon le type de locus de contrôle et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		Femmes	
	Consommateurs d'alcool	Abstèmes	Consommatrices d'alcool	Abstèmes
Totalement externe	9,9	11,6	10,2	18,5
Externe	20,4	26,1	23,7	28,7
Interne	36,6	29,2	37,1	31,3
Totalement interne	33,0	33,1	28,9	21,5
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

Tableau 359 : Distribution de la population selon le niveau d'instruction et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		Femmes	
	Consommateurs d'alcool	Abstèmes	Consommatrices d'alcool	Abstèmes
Primaire ou inférieur	30,3	43,6	17,9	45,0
Secondaire	55,7	43,4	63,5	45,5
Supérieur	13,9	13,0	18,6	9,5
	100%	100%	100%	100%

Tableau 360 : Distribution de la population selon la satisfaction à l'égard du soutien social et le sexe. Populations consommatrice d'alcool et populations totales.

	Hommes		Femmes	
	Consommateurs d'alcool	Abstèmes	Consommatrices d'alcool	Abstèmes
Très satisfait	57,4	56,6	55,6	51,7
Plutôt satisfait	28,1	26,5	28,3	30,4
Plutôt insatisfait	11,1	12,4	11,2	12,3
Très insatisfait	3,4	4,5	4,8	5,6
	100%	100%	100%	100%

Les cellules grisées indiquent une différence entre hommes et femmes statistiquement significative au seuil de 0,05.

2.2.2. Les paramètres

Tableau 361 : Ajustement des modèles, populations ayant consommé de l'alcool et des abstèmes au cours des deux dernières semaines (Posterior predictive p-values).

	Estonie			**Lettonie**		**Lituanie**	
	1994	**1999**	**EHIS-1996**	**1994**	**1999**	**1994**	**1999**
Hommes							
Consommateurs d'alcool	0,49	0,49	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
Abstèmes	0.50	0.51	0.51	0.50	0.50	0.51	0.49
Femmes							
Consommateurs d'alcool	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50	0,51
Abstèmes	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.51

Enquêtes NORBALT

Tableau 362 : Coefficients de régression. Abstèmes et consommateurs d'alcool. Population masculine. Estonie, Lettonie et Lituanie, 1994.

	Estonie		Lettonie		Lituanie	
	Abstèmes	Buveurs	Abstèmes	Buveurs	Abstèmes	Buveurs
Santé psychologique → Santé subjective	0,169	0,134	0,205	0,193	0,181	0,168
Instruction → Locus de contrôle	0,459	0,569	0,330	0,401	0,225*	0,497*
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,026	-0,032	-0,065	-0,048	-0,017	-0,110
Santé physique → Santé psychologique	0,309	0,266	0,297	0,215	0,440	0,282
Santé physique → Santé subjective	0,567	0,508	0,429	0,432	0,388	0,407
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,092	-0,100	-0,086	-0,089	-0,180	-0,096
Consommation d'alcool → Santé subjective		-0,001		-0,002		0,025
Instruction → Consommation d'alcool		0,024		-0,053		0,035
Santé psychologique → Consommation d'alcool		0,044		0,056		0,090
Santé physique → Consommation d'alcool		-0,027		-0,028		-0,076
Santé physique ↔ Instruction	-0,108	-0,051	-0,106	-0,063	-0,075	-0,077

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre la population abstème et celle des consommateurs d'alcool dans le même pays au seuil de 0,05.
Aucune différence entre consommateurs d'alcool des trois états n'est significative.

Tableau 363 : Coefficients de régression. Abstèmes et consommateurs d'alcool. Population masculine. Estonie, Lettonie et Lituanie, 1999 (Distributions a priori informatives).

	Estonie		Lettonie		Lituanie	
	Abstèmes	Buveurs	Abstèmes	Buveurs	Abstèmes	Buveurs
Santé psychologique → Santé subjective	0,186	0,134	0,222	0,167	0,235	0,196
Instruction → Locus de contrôle	0,444	0,536[ab]	0,321	0,397[a]	0,285	0,351[b]
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,019	-0,030	-0,075	**-0,041**	-0,048	-0,087
Santé physique → Santé psychologique	0,339	0,297	0,352	0,244	0,402	0,293
Santé physique → Santé subjective	0,548	0,510	0,440	0,452	0,499	0,460
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,101	-0,096	-0,105	-0,100	-0,114	-0,082
Consommation d'alcool → Santé subjective		-0,012		0,000		0,019
Instruction → Consommation d'alcool		0,030		-0,047		0,017
Santé psychologique → Consommation d'alcool		0,044		0,061		**0,058**
Santé physique → Consommation d'alcool		-0,008		0,002		-0,038
Soutien social →Santé psychologique	0,061	0,004	-0,034	0,014	0,025	0,029
Santé physique ↔ Instruction	-0,091	-0,035	-0,090	-0,055	-0,097	-0,029
Santé physique ↔ Soutien social	**0,036**	0,014	**0,047**	-0,007	0,080*	0,001*
Soutien social ↔ Instruction	0,054*	**-0,024***	**-0,022**	-0,025	-0,001	-0,037

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre la population abstème et celle des consommateurs d'alcool dans le même pays au seuil de 0,05.
[a, b, c] indiquent des paramètres significativement différents entre consommateurs d'alcool des trois états au seuil de 0,05.

Tableau 364 : Coefficients de régression. Abstèmes et consommatrices d'alcool. Population féminine. Estonie, Lettonie et Lituanie, 1994.

	Estonie		Lettonie		Lituanie	
	Abstèmes	Buveurs	Abstèmes	Buveurs	Abstèmes	Buveurs
Santé psychologique → Santé subjective	0,196	0,140	0,226	0,193	0,209	0,238
Instruction → Locus de contrôle	0,435	0,523	0,265	0,406	0,290	0,460
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,083	-0,066	-0,076	-0,084	-0,042	-0,081
Santé physique → Santé psychologique	0,242	0,239	0,254	0,275	0,301	0,244
Santé physique → Santé subjective	0,491	0,516[a]	0,329	0,359[a]	0,332	0,378
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,087	-0,106	-0,123	-0,093	-0,202	-0,099
Consommation d'alcool → Santé subjective		0,024		0,013		-0,105
Instruction → Consommation d'alcool		0,060		0,019		0,075
Santé psychologique → Consommation d'alcool		-0,002		0,042		-0,029
Santé physique → Consommation d'alcool		0,001		-0,044		-0,046
Santé physique ↔ Instruction	-0,067	-0,042	-0,101	-0,055	-0,108	-0,070

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre la population abstème et celle des consommateurs d'alcool dans le même pays au seuil de 0,05.
a, b, c indiquent des paramètres significativement différents entre consommateurs d'alcool des trois états au seuil de 0,05.

Tableau 365 : Coefficients de régression. Abstèmes et consommatrices d'alcool. Population féminine. Estonie, Lettonie et Lituanie, 1999 (Distributions a priori informatives).

	Estonie		Lettonie		Lituanie	
	Abstèmes	Buveurs	Abstèmes	Buveurs	Abstèmes	Buveurs
Santé psychologique → Santé subjective	0,184	0,138[a]	0,220	0,207	0,246	0,239[a]
Instruction → Locus de contrôle	0,389	0,449	0,254	0,348	0,246*	0,387*
Locus de contrôle → Santé psychologique	-0,086	-0,076	-0,093	-0,059	-0,054	-0,087
Santé physique → Santé psychologique	0,254	0,232	0,263	0,292	0,309	0,205
Santé physique → Santé subjective	0,492	0,485[ab]	0,342	0,375[a]	0,382	0,393[b]
Locus de contrôle → Santé subjective	-0,105	-0,116	-0,092	-0,096	-0,137	-0,104
Consommation d'alcool → Santé subjective		0,002		-0,026		-0,076
Instruction → Consommation d'alcool		0,071		0,008		**0,045**
Santé psychologique → Consommation d'alcool		-0,005		0,030		0,016
Santé physique → Consommation d'alcool		-0,030		-0,038		-0,001
Soutien social →Santé psychologique	0,028	0,048	0,182	0,134	0,159	-0,009
Santé physique ↔ Instruction	-0,129	-0,032	-0,097	-0,040	-0,104*	-0,011*
Santé physique ↔ Soutien social	0,058*	0,003*	0,062	0,017	0,042	0,009
Soutien social ↔ Instruction	-0,071*	-0,009*	-0,027	-0,062	-0,025	-0,054

Les paramètres grisés sont significatifs au seuil de 0,05.
Les paramètres en gras sont significatifs au seuil de 0,10.
L'astérisque suivant la valeur des paramètres indique que ceux-ci sont significativement différents entre la population abstème et celle des consommateurs d'alcool dans le même pays au seuil de 0,05.
a, b, c indiquent des paramètres significativement différents entre consommateurs d'alcool des trois états au seuil de 0,05.